



# 藥物 常識

## 灰錳氧溶液

## KMnO<sub>4</sub> 藥水

## 使用指引



香港浸信會醫院  
Hong Kong Baptist Hospital

除非醫生特別指明，否則一般坐浴或浸浴濃度是用一茶匙 (5ml) 開水至 2 公升 (1:10000)

1. 戴上即用即棄膠手套
2. 根據自己體型或需要浸浴的部位，注入已煲滾之溫水入潔淨浴盆〔水量最好是 2 公升之倍數〕，切勿用熱水，以免被熱水灼傷
3. 根據水量，注入適量藥水【例如：5 毫升〔一茶匙〕 → 2 公升、7.5 毫升〔一茶匙半〕 → 3 公升、如此類推】，稀釋後的藥水呈淺粉紅色或淺紫色

4. 坐浴時間大約 5 至 10 分鐘，或者至溫水變凍為止
  5. 坐浴後不用過清水，只用潔淨毛巾抹乾便可
- ✧ 如不慎令其他皮膚沾上藥水，立即用清水和肥皂清洗，經過數日後，膚色便會逐漸回復正常
  - ✧ 注意：浴盆和毛巾會被染上顏色，除了在浸浴時使用外，不適合作其他用途

此藥物指引只供參考之用。

用藥應照醫生指示。

如有疑問請向主診醫生或藥房職員查詢。

藥物查詢熱線: 23398964

香港浸信會醫院網址: [www.hkbh.org.hk](http://www.hkbh.org.hk)