

白內障


Cataract



什麼是白內障？

人的眼睛如同照相機，光線首先會通過眼睛的角膜再穿過晶體，然後聚焦而投射到視網膜上，最後通過視網膜的感光細胞由視覺神經傳送至大腦，我們才看見色彩繽紛的世界。

當眼睛的晶體變得渾濁時稱為「白內障」。隨著晶體渾濁的程度增加，視力便會漸漸變得模糊，嚴重的可引致青光眼及虹膜炎，甚至失明。



為什麼會患白內障？

白內障通常是老化所致，但眼外傷、遺傳、糖尿病，甚至服用某些藥物也可以引致白內障。

白內障有什麼徵狀？

早期的白內障不會有任何徵兆，眼睛不會產生疼痛或發紅，視力亦未必會受到太大的影響。不過，當白內障的情況漸變嚴重，就會產生以下常見的病徵：

白內障的徵狀

- 視力模糊
- 對強光敏感
- 影像的顏色變得暗淡
- 閱讀時感到光線不足
- 眼鏡度數經常需要改變




怎樣治療白內障？

現時，唯一被確定為有效治療白內障的方法是外科手術。現代的醫學技術十分先進，醫生運用顯微外科手術便可以安全而有效地摘取渾濁的晶體，然後植入人工晶體(IOL)代替。事實上，時時的白內障手術可以說是最成功的外科手術之一，約95%的白內障患者在手術後，視力都可得到改善。



黃色的人工晶體

現代眼科專家普遍採用較小手術切口的方法，稱為「白內障超聲乳化」(Phacoemulsification) 手術。這是一種特殊的外科技術，結合嶄新的超聲乳化設備系統和摺入型人工晶體技術。手術中，醫生將小型的超聲波探針插入眼內，探針能將渾濁的晶體分解(乳化)成微小碎片，然後輕輕將這些小碎片吸出，繼而植入人工晶體。



白內障手術的過程

白內障手術前會進行超聲波檢查(A-Scan)，以便選用適當屈光度的人工晶體。

大部份的白內障手術均可採用局部麻醉進行，手術期間病人不會感到痛楚。不過，如病人未能按指示或程序而行、兒童或不能平臥者，可選擇以全身麻醉進行手術。

超聲乳化手術的運用日漸普及，好處是傷口十分細小，而且不需縫合，非常安全、快捷及舒適。病人不需待白內障成熟才接受手術，他們可按日常工作或生活對視力的需求，向醫生諮詢，以決定何時接受手術。

白內障手術套式計劃

白內障超聲波乳化術及人工晶體植入術
(每隻眼) 套式計劃

服務內容	套式一 (門診計劃)	套式二 (住院計劃)
駐院專科醫生手術費及局部麻醉費	✓	✓
超聲波檢查 (A-Scan)	✓	✓
手術室費及所需用的手術儀器和物料	✓	✓
住院常規護理	不適用	✓
房租 (入住標準病房一晚)	不適用	✓
與手術相關之基本藥物	✓	✓
手術後三次覆診 (包括手術翌日第一次覆診)	✓	✓
合共港幣 \$	\$14,000	\$16,000

服務時間 (敬請預約)

星期一至五 上午8時至下午7時
星期六 上午8時至下午5時
星期日及公眾假期休息

 香港浸信會醫院
Hong Kong Baptist Hospital

激光矯視及白內障中心
香港九龍窩打老道222號B座4樓
電話：2339 8422
傳真：2304 5839
網址：<http://www.hkbh.org.hk>

 50th Anniversary
同心服務
caringorganisation
Member of the Hong Kong Council of Social Service