香港浸信會醫院
Hong Kong Baptist Hospital

乳腺管切除術
Microdochectomy

醫療程序須知

簡介

通過手術將乳腺管切除，以明確診斷乳頭不尋常分泌物的病理及控制症狀；如組織化驗報告証實為惡性腫瘤，可能需再入院進行第二次手術。

適應症

乳頭不尋常分泌物，例如出血。

手術 / 程序過程

1. 於全身麻醉或監察麻醉下進行。
2. 首先找出有不尋常分泌物的乳腺管乳頭出口位置。
3. 可能會注入藍色顯映劑 (Methylene Blue) 或用導線引入乳腺管。
4. 在乳暈作一切口，將乳腺管切除。
5. 然後進行病理化驗，以確定腫塊性質。

手術 / 程序前須知

1. 入院前請除去所有飾物及抹去指甲油，請勿携帶貴重物品或大量現金。
2. 入院時請帶備個人清潔衛生用品，例如：睡衣、拖鞋等。
3. 手術當天或前一天入院，按醫囑需要時作術前常規檢查：例如抽血、肺部 X 光、心電圖、驗小便等，並簽署「接受醫療程序同意書」。
4. 麻醉科醫生亦會作術前評估：解釋禁飲食時間、全身麻醉可能引起的風險，並簽署「接受麻醉同意書」。
5. 皮膚預備：手術前沖涼及洗頭。
6. 往手術室前更換手術袍、戴帽，除去自己衣物包括內衣褲、飾物及假牙等，並先排清小便。

手術 / 程序後須知

1. 會量度生命表徵及觀察傷口的情況。
2. 全身麻醉後，喉嚨可能感到疼痛不適、有痰，宜多作深呼吸運動，並用雙手輕按腹部以助痰涎咳出。
3. 感覺噁心、嘔吐或傷口疼痛，請通知護士，需要時可給予藥物以減輕症狀。
4. 傷口用無菌敷料及膠布遮蓋，一般不用換症；當醫生除去敷料檢視傷口後，便會更換敷料，請保持傷口乾爽清潔；如發現傷口敷料有任何異常，請通知當值護士。
5. 按醫囑正常均衡飲食，除因內科疾病需飲食限制外，一般無需戒口。
6. 可佩帶合適胸罩，以舒適富盛托力為合。
7. 按醫囑開始活動，有助迅速康復。

Patient's Label
Patient Name: _____
Hospital No:_____
Adm No/Episode No:_____

風險及併發症

1. 傷口疼痛。
2. 傷口感染。
3. 傷口周圍出現瘀腫(一般會自行消散，無需特別治療)
4. 出血(可能需再施行手术清除血塊)。
5. 乳頭感覺敏感度下降。
6. 如最後組織化驗報告証實為惡性腫瘤，需再入院進行第二次切除或其他跟進手術。

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

1. 仁安醫院手術資料：顯微乳管探查手術 (15-5-2014)

2. National Health Services, Information Sheet: Microdochectomy (Breast Duct Excision) (11/2013)

Patient's Label
Patient Name: _____
Hospital No:_____
Adm No/Episode No:_____

病人簽署：_____ 簽署日期：_____