香港浸信會醫院
Hong Kong Baptist Hospital

宫腔镜肌肉瘤 / 息肉切除术
Hysteroscopic Resection of Fibroids / Polyps

宫腔镜肌肉瘤 / 息肉切除术 Hysteroscopic Resection of Fibroids / Polyps

医疗程序须知

简介

利用宫腔镜置入电切器，经阴道及子宫颈到达宫腔，把肌瘤 / 息肉剔除，然后止血。

适应症

- 子宫内膜肌肉瘤或息肉

手术 / 程序过程

1. 全身麻醉 / 区域性麻醉
2. 扩张子宫颈
3. 插入切除镜
4. 注入甘氨酸 / 生理盐水以膨胀宫腔
5. 宫腔镜直接监察下进行切除肌瘤 / 息肉及止血
6. 除非特别声明，所有取出的组织会送交病理化验部或依惯常程序处理
7. 手术期间可能要采用其他相关步骤如输血

手术 / 程序前须知

1. 需签署手术同意书
2. 于手术前 6 小时开始禁饮食
3. 使用米索前列醇松弛子宫颈
4. 除去身上所有衣物（包括内衣裤）和物品，例如假牙、饰物和隐形眼镜等，换上手术衣着
5. 往手术室前先排清小便

手术 / 程序后须知

1. 全身麻醉后，病人或会感到疲倦、渴睡、恶心及呕吐，如情况持续或加剧，请通知医护人员
2. 虽可以怀孕但有子宫破裂的危险
3. 可能减低受孕机会
4. 将来怀孕可能需要剖腹生产
5. 手术后兩周内或有阴道出血现象
6. 行经期妇女在手术前有使用过药物(荷尔蒙药物)，药力过后会再有月经

Patient's Label
Patient Name: _____
Hospital No:_____
Adm No/Episode No:_____

香港浸信會醫院
Hong Kong Baptist Hospital

宫腔镜肌肉瘤 / 息肉切除术
Hysteroscopic Resection of Fibroids / Polyps

宫腔镜肌肉瘤 / 息肉切除术 Hysteroscopic Resection of Fibroids / Polyps

风险及并发症

1. 麻醉并发症
2. 由松弛子宫颈药物引起的副作用如恶心、呕吐、腹泻、发烧、诱发哮喘、过敏等
3. 出血，可能需要输血
4. 盘腔感染
5. 子宫颈撕裂
6. 子宫穿孔及有机会损伤附近器官，可能需要剖腹探查或修补
7. 甘氨酸摄入过多
8. 未能完成切除而需要再进行手术
9. 复发

其他治療 / 检查方法

- 子宫切除术

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

医院管理局「智友站」网页：宫腔镜肌肉瘤切除 / 瘪肉切除（2008）



Patient's Label
Patient Name: _____
Hospital No:_____
Adm No/Episode No:_____

病人签署：_____ 签署日期：_____