

香港兒童免疫接種計畫

項目	注意事項	出生	6 周至 2個月	4 個月	6 個月	9 個月	12 個月	18 個月	24 個月	本院 提供	健康 院提 供
卡介苗		*								√	
乙型肝炎疫苗	如於出生後 6 周至 2 個月及 6 個月注射 6 合 1 混合疫苗，無需注射此疫苗	*	*		*					√	√
▲6 合 1 混合疫苗			*		*					√	
▲5 合 1 混合疫苗				*				*		√	
肺炎球菌疫苗			*	*			*			√	√
輪狀病毒疫苗	第一次要在出生後 16 周前服用，第二次在 24 周前服用		*	*						√	
麻疹, 流行性腮腺炎, 德國麻疹及水痘混合疫苗							*	*		√	
乙型流感嗜血桿菌	如注射 6 合 1 或 5 合 1 混合疫苗，無需注射此疫苗		*	*	*			*		√	
甲型肝炎疫苗							*		*	√	
腦膜炎雙球菌結合疫苗	2 歲後只需注射一針					*	*			√	
日本腦炎疫苗							*		*	√	
麻疹, 流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗	如注射麻疹, 流行性腮腺炎, 德國麻疹水痘混合疫苗，無需注射此疫苗						*			√	√
水痘疫苗	如注射麻疹, 流行性腮腺炎, 德國麻疹水痘混合疫苗，無需注射此疫苗						*			√	√
▲4 合 1 混合疫苗	如注射 6 合 1 或 5 合 1 混合疫苗，無需注射此疫苗		*	*	*			*			√

▲6 合 1 混合疫苗 ---- 白喉、破傷風、無細胞型百日咳、乙型流感嗜血桿菌、滅活小兒麻痺及乙型肝炎

▲5 合 1 混合疫苗 ---- 白喉、破傷風、無細胞型百日咳、乙型流感嗜血桿菌及滅活小兒麻痺

▲4 合 1 混合疫苗 ---- 白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺



疫苗種類	可預防的傳染病	傳染病可引致的後果
卡介苗	肺結核	慢性傳染病，可入侵身體多個器官
乙型肝炎疫苗	乙型肝炎	肝炎及肝癌
白喉, 破傷風, 百日咳疫苗	白喉	咽喉腫, 發燒, 呼吸困難及心臟受損
	破傷風	肌肉抽搐及痙攣, 甚至死亡
	百日咳	長時間咳嗽, 肺炎及腦部受損
小兒麻痺疫苗	小兒麻痺	損害神經系統及導致麻痺, 嚴重者可引致死亡
乙型流感嗜血桿菌疫苗	乙型流感嗜血桿菌	腦膜炎, 中耳炎, 關節炎及肺炎等
肺炎鏈球菌接合疫苗	肺炎鏈球菌	細菌性肺炎, 腦膜炎, 菌血症, 蜂窩組織炎(軟組織感染), 骨髓炎(骨骼感染), 關節炎(關節感染)及急性中耳炎
麻疹, 流行性腮腺炎, 德國麻疹及水痘混合疫苗	麻疹	腦膜炎或腦炎等
	流行性腮腺炎	腦膜炎, 胰臟炎; 如青春期中後感染病毒, 有可能引致不育
	德國麻疹	若妊娠婦女受到感染, 可能會對胎兒造成失明及先天性心臟病等嚴重損害
	水痘	全身出現紅疹及水泡, 而水泡結痂後可能會留下永久性疤痕; 小腦炎
口服輪狀病毒疫苗	輪狀病毒	發燒, 嘔吐及腹瀉, 以致脫水而令主要器官衰竭的風險增加
腦膜炎雙球菌疫苗	腦膜炎雙球菌	腦膜炎敗血病, 甚至死亡; 後遺症包括耳聾, 神經疾病和截肢
日本腦炎疫苗	日本腦炎	沒有特定藥物去治療。病者會頭痛高燒, 神志不清抽搐, 康復者有可能有神經系統後遺症
甲型肝炎疫苗	甲型肝炎	嚴重肝病, 肝衰竭甚至死亡

* 疫苗供應或會出現短缺情況, 詳情請向醫護人員查詢。