

香港兒童免疫接種計劃

| 項目 | 注意事項 | 出生 | 6 週 至 2 個月 | 4 個月 | 6 個月 | 9 個月 | 12 個月 | 18 個月 | 24 個月 | 本院 提供 | 健康 院 提供 |
|-------------------------|--|----|------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 卡介苗 | | * | | | | | | | | √ | |
| 乙型肝炎疫苗 | 如於出生後 6 週至 2 個月及 6 個月注射 6 合 1 混合疫苗，無需注射此疫苗 | * | * | | * | | | | | √ | √ |
| ▲6 合 1 混合疫苗 | | | * | | * | | | | | √ | |
| ▲5 合 1 混合疫苗 | | | | * | | | | * | | √ | |
| 肺炎球菌疫苗 | | | * | * | * | | * | | | √ | √ |
| 輪狀病毒疫苗 | 第一次要在出生後 16 週前服用，第二次在 24 週前服用 | | * | * | | | | | | √ | |
| 麻疹, 流行性腮腺炎, 德國麻疹及水痘混合疫苗 | | | | | | | * | * | | √ | |
| 乙型流感嗜血桿菌 | 如注射 6 合 1 或 5 合 1 混合疫苗，無需注射此疫苗 | | * | * | * | | | * | | √ | |
| 甲型肝炎疫苗 | | | | | | | * | | * | √ | |
| 腦膜炎雙球菌結合疫苗 | 2 歲後只需注射一針 | | | | | * | * | | | √ | |
| 日本腦炎疫苗 | | | | | | | * | | * | √ | |
| 麻疹, 流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗 | 如注射麻疹, 流行性腮腺炎, 德國麻疹水痘混合疫苗，無需注射此疫苗 | | | | | | * | | | √ | √ |
| 水痘疫苗 | 如注射麻疹, 流行性腮腺炎, 德國麻疹水痘混合疫苗，無需注射此疫苗 | | | | | | * | | | √ | √ |
| ▲4 合 1 混合疫苗 | 如注射 6 合 1 或 5 合 1 混合疫苗，無需注射此疫苗 | | * | * | * | | | * | | | √ |

▲6 合 1 混合疫苗 ---- 白喉、破傷風、無細胞型百日咳、乙型流感嗜血桿菌、滅活小兒麻痺及乙型肝炎

▲5 合 1 混合疫苗 ---- 白喉、破傷風、無細胞型百日咳、乙型流感嗜血桿菌及滅活小兒麻痺

▲4 合 1 混合疫苗 ---- 白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺



| 疫苗種類 | 可預防的傳染病 | 傳染病可引致的後果 |
|-----------------------|----------|--|
| 卡介苗 | 肺結核 | 慢性傳染病，可入侵身體多個器官 |
| 乙型肝炎疫苗 | 乙型肝炎 | 肝炎及肝癌 |
| 白喉，破傷風，百日咳疫苗 | 白喉 | 咽喉腫，發燒，呼吸困難及心臟受損 |
| | 破傷風 | 肌肉抽搐及痙攣，甚至死亡 |
| | 百日咳 | 長時間咳嗽，肺炎及腦部受損 |
| 小兒麻痺疫苗 | 小兒麻痺 | 損害神經系統及導致麻痺，嚴重者可引致死亡 |
| 乙型流感嗜血桿菌疫苗 | 乙型流感嗜血桿菌 | 腦膜炎，中耳炎，關節炎及肺炎等 |
| 肺炎鏈球菌接合疫苗 | 肺炎鏈球菌 | 細菌性肺炎，腦膜炎，菌血症，蜂窩組織炎（軟組織感染），骨髓炎（骨骼感染），關節炎（關節感染）及急性中耳炎 |
| 麻疹，流行性腮腺炎，德國麻疹及水痘混合疫苗 | 麻疹 | 腦膜炎或腦炎等 |
| | 流行性腮腺炎 | 腦膜炎，胰臟炎；如青春期後感染病毒，有可能引致不育 |
| | 德國麻疹 | 若妊娠婦女受到感染，可能會對胎兒造成失明及先天性心臟病等嚴重損害 |
| | 水痘 | 全身出現紅疹及水泡，而水泡結痂後可能會留下永久性疤痕；小腦炎 |
| 口服輪狀病毒疫苗 | 輪狀病毒 | 發燒，嘔吐及腹瀉，以致脫水而令主要器官衰竭的風險增加 |
| 腦膜炎雙球菌疫苗 | 腦膜炎雙球菌 | 腦膜炎敗血病，甚至死亡；後遺症包括耳聾，神經疾病和截肢 |
| 日本腦炎疫苗 | 日本腦炎 | 沒有特定藥物去治療。病者會頭痛高燒，神志不清抽搐，康復者有可能有神經系統後遺症 |
| 甲型肝炎疫苗 | 甲型肝炎 | 嚴重肝病，肝衰竭甚至死亡 |

* 疫苗供應或會出現短缺情況，詳情請向醫護人員查詢。