

## 简介

病人如需要接受动脉或静脉注射造影剂检查，医生会注射造影剂入动脉或静脉，然后用 X 光检查。一般来说，造影剂是一种安全的药物，但间中亦会引起副作用。医生相信这项检查是必须的，因为它所提供的资料有助加深了解病情及诊治。

## 风险及并发症

1. 造影剂可能引起的副作用。
  - **轻微副作用**：例如痕痒、荨麻疹、作呕、热暖感觉、臂痛、打喷嚏、咳嗽等。此等症状均属暂时性，无需特别治理。
  - **中度副作用**：这些副作用较严重，并持续较久。病人可能出现荨麻疹、发热及发冷、血压上升或下降及心悸等。遇此情况通常需要延医诊治，但病人没有危险。
  - **严重副作用**：严重反应例如气喘、心律不调、胸口痛、抽搐、肾衰竭、昏迷等，有可能会造成损害。遇此情况需要紧急就医，通常须入院治理。
  - **死亡**：情况很罕见，但造影剂如许多药物一样，亦有可能会引致死亡。注射非离子性造影剂引致死亡的机会率大约为 1/250,000。
  - **延迟性副作用**：很少病人会出现此情况，并通常在 24 小时内发生。症状包括像感冒不适、臂痛、痕痒、皮疹、唾液腺疼痛或肿胀等。
2. 静脉注射的针口位置可能有疼痛的感觉。若造影剂意外地由针口渗漏到手臂的软组织，该处或会肿痛、感觉不适。一般肿痛数日内会消失。某些罕见的例子，该软组织有可能坏死。
3. 若出现呕吐现象，胃内之口服造影剂有可能被吸入肺部。

## 免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出现常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

## 参考资料

医管局「智友站」网页：接受动脉或静脉注射造影剂须知（2004）