



醫療程序須知

簡介

通過此檢查，協助診斷血管的各種病變。

手術 / 程序過程

1. 醫生在病人的腹股溝間或手腕注射局部麻醉藥。
2. 然後切開小部份表皮，用針穿刺血管後插入導管，進入大動脈，通過透視將導管移動至所需檢查的血管，注入造影劑。
3. 如病人的腹股溝部位不適宜作穿刺，需在前臂彎的位置插入導管利用特備的 X 光儀器錄取血管造影。
4. 最後拔出導管。
5. 病童通常需使用鎮靜劑或全身麻醉。
6. 檢查須時約一至二小時。

手術 / 程序前須知

1. 檢查前，醫生會為病人檢查血液凝結指數及盡可能矯正。
2. 如懷疑可能或已經懷孕，請先通知放射科職員。
3. 如曾患哮喘、風疹、濕疹、敏感性、鼻炎、對某些食物、藥物及 X 光造影劑有過敏反應，請事先通知醫生。
4. 需簽署同意書。
5. 檢查前六小時不可飲食。糖尿病人請遵照醫生指示調節藥份。
6. 手術部位的體毛須剃光及清潔。
7. 檢查前須排清小便。
8. 檢查進行時，請聽從醫護人員指導。

手術 / 程序後須知

1. 拔出導管後，傷口部位須按壓約十分鐘止血。
2. 檢查後，病人須回病房休息及接受觀察。

風險及併發症

1. 併發症的機會一般很少。
2. 對造影劑產生過敏反應。
3. 穿刺部位出血，或形成血腫。
4. 傷口附近的組織如受到感染、會有腫痛或滲液。
5. 血管栓塞。
6. 檢查組織受破壞。

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫管局「智友站」網頁：血管造影檢查 (2010)

病人簽署：_____ 簽署日期：_____

Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Episode No: _____