



醫療程序須知

簡介

心包積液乃指心臟外圍的薄膜有積水，成因包括細菌感染、發炎、惡性腫瘤、代謝疾病、充血性心力衰竭、創傷等等。心包積液會阻礙心臟擴張，引致功能受損。急性積液會導致急性肺水腫，休克或突發死亡，需要作緊急穿刺引流。心包穿刺引流積液是經皮下穿刺介入方法，通常使用心臟超聲波導引，放入引流管引出積液，使心臟功能回復正常；將引出的積液進行化驗，亦有助瞭解病情。若拒絕是項手術，病者的病情會加速惡化。

適應症

因細菌感染、發炎、惡性腫瘤、代謝疾病、充血性心力衰竭、創傷等引致心臟外圍的薄膜有積水。

手術 / 程序過程

1. 醫生會使用心臟超聲波以確定穿刺位置。通常是劍突位置以下，或心尖位置。
2. 手術部位會進行消毒。
3. 穿刺位置會進行局部麻醉。
4. 醫生會將刺針刺入心包，並經刺針放入綱絲。再經綱絲放入引流管，引流管外接消毒容器。心包積液會被引流出體外。
5. 積液會作進一步化驗以瞭解病因。

手術 / 程序前須知

1. 醫生會替病人做心臟超聲波，以確定心包積液的位置，程度及臨床重要性。
2. 醫生會詳細解釋是項手術的好處、施行過程及風險，而病人需要簽署手術同意書。
3. 醫護人員會監測病人的血壓，心跳及心電圖。病人亦可能需要靜脈輸液。
4. 若手術乃非緊急，而病人正服用薄血藥，可能需要於手術前數天停藥。如遇緊急情況，會使用特效藥以中和薄血藥性能。

手術 / 程序後須知

1. 引流管會持續保留，直至積液全部排出或心包再沒積液，可能需時數天。
2. 醫生有可能移動引流管以方便積液排出。
3. 醫生會利用心臟超聲波確定心包積液情況。
4. 引流管移除後，傷口會蓋上消毒紗布。請保持傷口清潔，沐浴時請避免弄濕紗布。如紗布被弄濕，請立即更換。
5. 醫生會向解釋手術結果及商討治療計劃。

<p>Patient's Label Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____</p>
--



風險及併發症

1. 此手術會有一定風險。
2. 嚴重併發症 (2-4%) 包括死亡、心臟病發、心壁破穿、肝臟受損、氣胸及嚴重出血。

其他治療 / 檢查方法

病人可選擇外科手術打開心包作另類治療。

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫管局「智友站」網頁：心包穿刺術 (4/2019)

<p>Patient's Label Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____</p>
--

病人簽署：_____ 簽署日期：_____