



## 醫療程序須知

### 簡介

在正常情況腹腔裡只會有少量的液體存在。但是在某些疾病影響下，液體會在腹腔中累積。這些液體為腹水；腹腔穿刺術就是抽取腹水以用作檢查或治療用途的一種技術。

### 適應症

- 檢查用途：為原因不明的腹水作病理性診斷。
- 治療用途：較大量的腹水會被抽出以減輕因腹水所造成的腹部疼痛或呼吸困難。

### 手術 / 程序過程

1. 病人會被要求平躺於床上，或按需要採其他體位配合引流或抽取腹水。
2. 醫生會先在施針的位置進行皮膚消毒。
3. 然後醫生會在下針的位置施加局部麻醉藥。
4. 待藥力生效後，隨即將刺針穿透皮膚進入腹腔，並用針筒抽取腹水。
5. 醫生會抽出適量的腹水，以達到檢查或治療的目的。



### 手術 / 程序前須知

1. 病人需簽署手術同意書。
2. 於程序前小便。

### 手術 / 程序後須知

1. 檢查完成後，病人需遵醫囑在床上休息。
2. 醫護人員將緊密監察病人之血壓、脈搏，以觀察併發症有否出現。

### 風險及併發症

一般來說，這是一個風險相對較低的檢查。但基於病人的個別因素，還是會有併發症的出現。罕見但嚴重的併發症，包括嚴重內出血、感染、腎衰竭、低鈉症、肝昏迷、腸臟意外被刺穿或腹水滲漏。

### 免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

### 參考資料

Runyon, B. A., Chopra, S. & Robson, K. M. (2017). Diagnostic and Therapeutic abdominal paracentesis. *UpToDate*. Retrieved on 15/11/2018 from [https://www.uptodate.com/contents/diagnostic-and-therapeutic-abdominal-paracentesis?search=abdominal%20paracentesis&source=search\\_result&selectedTitle=1~76&usage\\_type=default&display\\_rank=1](https://www.uptodate.com/contents/diagnostic-and-therapeutic-abdominal-paracentesis?search=abdominal%20paracentesis&source=search_result&selectedTitle=1~76&usage_type=default&display_rank=1)

病人簽署：\_\_\_\_\_ 簽署日期：\_\_\_\_\_

#### Patient's Label

Patient Name: \_\_\_\_\_  
Hospital No: \_\_\_\_\_  
Episode No: \_\_\_\_\_