



## 醫療程序須知

### 簡介

通過內窺鏡，去除鼻及鼻竇疾病，建立鼻竇引流。

### 適應症

- 鼻竇炎
- 鼻息肉
- 鼻或鼻竇腫瘤

### 手術 / 程序過程

1. 手術會在內窺鏡控制和監察下進行
2. 疾病組織會被切除，正常結構則予保留。

### 手術 / 程序前須知

1. 請告訴醫生你的醫療及服藥情況。藥物可能需要作恰當的增減。
2. 預期結果
  - 2.1 改善鼻塞、後鼻漏、面部疼痛、頭痛等問題。
  - 2.2 預防鼻竇炎併發症
  - 2.3 摘除腫瘤
  - 2.4 可能會不能完全減輕症狀和有可能復發
3. 手術不能解決的問題
  - 3.1 其它過敏症狀：噴嚏、鼻癢、流鼻水。

### 手術 / 程序後須知

1. 手術後兩邊鼻孔都會塞入鼻敷料，所以你可能要用口呼吸，敷料會於一至兩日後取走，敷料後可能有輕微出血，但通常都會自行止血。
2. 敷料取去後，你可以出院回家。鼻水帶有小量血絲乃正常現象。你亦可能感到鼻塞。
3. 假如流血持續不止，請前往最近的急症室求診。
4. 請依約期覆診

### 風險及併發症

1. 手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。
2. 常見副作用和併發症 ( $\geq 1\%$  風險)
  - 2.1 鼻膜出血
  - 2.2 感染
  - 2.3 鼻腔粘連
  - 2.4 復發

#### Patient's Label

Patient Name: \_\_\_\_\_

Hospital No: \_\_\_\_\_

Adm No/Episode No: \_\_\_\_\_



3. 不常見的嚴重風險或併發症 (<1% 風險)
  - 3.1 損傷頸內動脈、篩前後動脈和蝶腭動脈，引致大出血。
  - 3.2 眼損傷，包括眶周淤血、眼球血腫或膿腫、重影、失明。
  - 3.3 淚管損傷，引致流淚。
  - 3.4 腦損傷，包括腦髓液鼻漏、腦膜炎、腦膿腫、腦氣腫。
  - 3.5 粘液囊腫
  - 3.6 聲音改變
  - 3.7 暫時或永久失去嗅覺
  - 3.8 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡
4. 不治療的後果
  - 4.1 症狀持續或加重
  - 4.2 鼻竇炎併發症

#### 其他治療 / 檢查方法

1. 激素
2. 抗生素治療感染

#### 免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

#### 參考資料

香港耳鼻喉科醫學院手術資訊單張：鼻及鼻竇內窺鏡手術 (2005-07)

#### 備註

\* 此手術名稱依據香港耳鼻喉科醫學院譯本

#### Patient's Label

Patient Name: \_\_\_\_\_  
Hospital No: \_\_\_\_\_  
Adm No/Episode No: \_\_\_\_\_

病人簽署：\_\_\_\_\_ 簽署日期：\_\_\_\_\_