



醫療程序須知

簡介

1. 切開耳廓引流液體 / 血液
2. 在傷口縫上棉花紗布，防止體液 / 血液再積聚。

適應症

- 耳血腫
- 耳廓軟骨積液

手術 / 程序過程

1. 局部麻醉 / 全身麻醉
2. 切開腫脹處
3. 引流患處的積液
4. 止血
5. 縫上棉花紗布，防止液體/血液再積聚。

手術 / 程序前須知

1. 告知醫生其本身患有的其他疾病，如糖尿病、心臟病、高血壓及定時服用的藥物，包括中藥及保健食品。
2. 遵從醫護人員指示，在需要時禁食。
3. 其他手術前準備或檢查
4. 預期結果
 - 4.1 迅速紓緩耳廓腫脹及痛楚
 - 4.2 防止耳廓變形
5. 手術不能解決的問題
 - 5.1 非因液體/血液積聚引致的耳廓腫脹

手術 / 程序後須知

1. 大約在一星期後除去棉花紗布
2. 手術後可出院回家
3. 預約覆診除去棉花紗布
4. 保持傷口清潔乾爽
5. 出院後可恢復正常活動
6. 如嚴重出血、傷口紅腫或有滲液、疼痛、發燒或發冷，應盡快求醫。

Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Episode No: _____



風險及併發症

1. 手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。
2. 常見副作用和併發症 (≥1% 風險)
 - 2.1 液體 / 血液再積聚
 - 2.2 出血
 - 2.3 感染
 - 2.4 疤痕/疤痕瘤
3. 不常見的嚴重風險或併發症 (<1% 風險)
 - 3.1 耳廓變形
 - 3.2 皮膚缺血/壞死
 - 3.3 耳廓軟骨膜炎
4. 不治療的後果
 - 4.1 感染
 - 4.2 耳廓變形

其他治療 / 檢查方法

1. 重複抽吸
2. 不作治療

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫管局「智友站」網頁：釘鈕(切開耳廓引流積液) (2/2020)

Patient's Label

Patient Name: _____
Hospital No: _____
Episode No: _____

病人簽署：_____ 簽署日期：_____