香港浸信會醫院
Hong Kong Baptist Hospital

* 內窺鏡惡性喉腫瘤激光切除術
Endoscopic Laser Excision of Carcinoma of Larynx

*內窺鏡惡性喉腫瘤激光切除術 Endoscopic Laser Excision of Carcinoma of Larynx

醫療程序須知

簡介

1. 通過內窺鏡，使用激光切除惡性喉腫瘤。
2. 保存喉功能

適應症

- 惡性喉腫瘤沒有累及重要結構
- 在內窺鏡下喉部能適當暴露

手術 / 程序過程

1. 放入喉鏡
2. 評估腫瘤位置
3. 使用激光切除腫瘤

手術 / 程序前須知

1. 告知醫生其本身患有的其他疾病，如糖尿病、心臟病、高血壓及定時服用的藥物，包括中藥及保健食。
2. 遵從醫護人員指示，在需要時禁食。
3. 其他手術前準備或檢查
4. 預期結果
   - 4.1 切除腫瘤
   - 4.2 保存聲音功能
   - 4.3 保存吞嚥功能
   - 4.4 保存喉部，避免氣管永久造口。
   - 4.5 有可能不能全部清除病灶及腫瘤有可能復發，因此或有需要重複激光切除手術，甚致要切除全喉。
5. 手術不能解決的問題
   - 5.1 較晚期的惡性喉腫瘤
   - 5.2 腫瘤轉移至遠處

手術 / 程序後須知

1. 當情況穩定可恢復正常飲食
2. 可能疼痛、聲音嘶啞及嗆咽。
3. 依時覆診
4. 如嚴重出血、氣促、虛脫、劇痛、發燒或有傷口感染跡象，應立即求醫。

Patient's Label
Patient Name: _____
Hospital No:_____
Adm No/Episode No:_____

風險及併發症

1. 手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。
2. 常見副作用和併發症 (>=1% 風險)
   - 2.1 聲音嘶啞
   - 2.2 吞嚥問題，包括氣哽。
   - 2.3 手術後出血
   - 2.4 牙齒、口、咽和喉損傷。
3. 不常見的嚴重風險或併發症 (<1% 風險)
   - 3.1 喉、氣管、皮膚或眼睛被激光燒傷。
   - 3.2 喉狹窄，引致氣道阻塞、發音改變。
   - 3.3 手術後黏膜水腫，引致氣道阻塞。
   - 3.4 皮下氣腫，引致呼吸困難。
   - 3.5 感染
   - 3.6 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡
4. 不治療的後果
   - 4.1 病情惡化引致死亡

其他治療 / 檢查方法

1. 放射治療
2. 切除全喉或部份喉

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫院管理局「智友站」網頁：內窺鏡惡性喉腫瘤激光切除術 (2009)

備註

* 此手術名稱依據香港耳鼻喉科醫學院譯本

Patient's Label
Patient Name: _____
Hospital No:_____
Adm No/Episode No:_____

病人簽署：_____ 簽署日期：_____