



## 醫療程序須知

### 簡介

切除下鼻甲

### 適應症

下鼻甲肥大引致的鼻塞

### 手術 / 程序過程

醫生會以手術儀器經鼻孔切除鼻腔內肥大的下鼻甲

### 手術 / 程序前須知

1. 請告訴醫生你的醫療及服藥情況。藥物可能需要作恰當的增減。
2. 預期結果
  - 2.1 緩解鼻塞
  - 2.2 有可能不會完全改善鼻塞和有可能復發
3. 手術不能解決的問題
  - 3.1 非下鼻甲肥厚引致的鼻塞

### 手術 / 程序後須知

1. 手術後兩邊鼻孔都會塞入鼻敷料，所以你可能要用口呼吸，敷料會於一至兩日後取走，取走敷料後可能有輕微出血，但通常都會自行止血。
2. 敷料取去後，你可以出院回家。鼻水帶有小量血絲乃正常現象。你亦可能感到鼻塞。假如流血持續不止，請前往最近的急症室求診。
3. 請依約期覆診。

### 風險及併發症

1. 手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。
2. 常見副作用和併發症 ( $\geq 1\%$  風險)
  - 2.1 出血
  - 2.2 持續鼻塞
  - 2.3 感染
  - 2.4 鼻腔粘連
  - 2.5 暫時痂皮
3. 不常見的嚴重風險或併發症 ( $<1\%$  風險)
  - 3.1 萎縮性鼻炎
  - 3.2 咽鼓管損傷
  - 3.3 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡
4. 不治療的後果
  - 4.1 持續鼻塞

#### Patient's Label

Patient Name: \_\_\_\_\_

Hospital No: \_\_\_\_\_

Episode No: \_\_\_\_\_



### 其他治療 / 檢查方法

藥物治療

### 免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

### 參考資料

醫管局「智友站」網頁：下鼻甲減容術 (2/2020)

<b>Patient's Label</b> Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____
--

病人簽署：\_\_\_\_\_ 簽署日期：\_\_\_\_\_