



醫療程序須知

簡介

切除中耳及乳突氣房病灶

適應症

- 膽脂瘤
- 急性乳突炎
- 慢性化膿性中耳炎和乳突炎
- 腫瘤

手術 / 程序過程

1. 手術會在全身麻醉下進行
2. 皮膚切口會在耳前或耳後
3. 乳突內的病灶會在顯微鏡下切除
4. 在大多情況下，手術後傷口需加壓包紮
5. 如有需要會用面神經顯示監察

手術 / 程序前須知

1. 請告訴醫生你的醫療及服藥情況，藥物可能需要作恰當的增減。
2. 手術前可能需要剃除耳旁邊毛髮
3. 預期結果
 - 3.1 清除膽脂瘤
 - 3.2 處理中耳和乳突感染
 - 3.3 有機會不能完全減輕症狀和有可能復發
 - 3.4 清除腫瘤
4. 手術不能解決的問題
 - 5.1 耳鳴
 - 5.2 暈眩
 - 5.3 弱聽

手術 / 程序後須知

1. 耳朵可能會出現痛楚或阻塞的感覺
2. 壓力敷料通常會在一日後拆除，請切勿自行拆除耳內敷料。醫生在覆診時，會替你更換或拆除敷料。
3. 耳朵排出一些分泌物乃屬正常。請切勿讓水流入耳內。

「 Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Episode No: _____

」



風險及併發症

1. 手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。
2. 常見副作用和併發症 ($\geq 1\%$ 風險)
 - 2.1 復發或殘留
 - 2.2 感染
 - 2.3 出血
 - 2.4 傳導性弱聽加重
 - 2.5 味覺失去或味覺紊亂
 - 2.6 對耳道填塞物過敏
 - 2.7 暈眩
3. 不常見的嚴重風險或併發症 ($<1\%$ 風險)
 - 3.1 面癱
 - 3.2 失去部份或全部聽力
 - 3.3 耳道狹窄
 - 3.4 耳廓變形
 - 3.5 顱內損傷，導致感染和出血。
 - 3.6 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡
4. 不治療的後果
 - 4.1 疾病惡化和出現併發症

其他治療 / 檢查方法

1. 定期耳道清潔和藥物治療
2. 抗菌素滴耳

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫管局「智友站」網頁：乳突切除術 (2/2020)

Patient's Label
Patient Name: _____
Hospital No: _____
Episode No: _____

病人簽署：_____ 簽署日期：_____