



## 醫療程序須知

### 簡介

摘除整個或部分上頷竇壁、內含物及相連結構。

### 適應症

- 上頷竇及硬腭惡性或良性瘤
- 通往上頷竇的相連結構
- 結合其他手術，治療同時涉及上頷竇的面中部惡性腫瘤。
- 罕見的嚴重上頷竇感染，須進行上頷竇清創術。

### 手術 / 程序過程

1. 可採用開放性或內窺鏡手術
2. 開放性手術會在鼻邊緣及眼下部切開，上唇可能切開
3. 摘除腫瘤及上頷竇部分或全部內壁

### 手術 / 程序前須知

1. 告知醫生其本身患有的其他疾病，如糖尿病、心臟病、高血壓及定時服用的藥物，包括中藥及保健食品。
2. 遵從醫護人員指示，在需要時禁食。
3. 其他手術前準備或檢查
4. 預期結果
  - 4.1 完全摘除上頷竇或硬腭腫瘤
  - 4.2 有機會未完全摘除腫瘤或感染，引致復發。
5. 手術不能解決的問題
  - 5.1 病灶蔓延至上頷竇周圍的重要結構
  - 5.2 遠處轉移

### 手術 / 程序後須知

1. 可能需用義體修補硬腭及牙齒缺損
2. 手術後可能需要服用止痛藥
3. 睡覺時頭部略為墊高，有助減少手術後出現水腫情況。
4. 不應擤鼻
5. 在手術後數星期應避免進行劇烈運動或身體接觸類體育運動
6. 如有咀嚼、吞嚥或說話困難，可能需要飲食輔導及言語治療。
7. 依時覆診
8. 如嚴重出血、虛脫、劇痛、發燒或有傷口感染跡象，應立即求醫。

### 風險及併發症

1. 手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。

#### Patient's Label

Patient Name: \_\_\_\_\_

Hospital No: \_\_\_\_\_

Episode No: \_\_\_\_\_



2. 常見副作用和併發症
  - 2.1 出血
  - 2.2 感染
  - 2.3 張開口腔困難
  - 2.4 受影響的一邊口腔咀嚼困難
  - 2.5 進食和喝水時返噎
  - 2.6 說話鼻音重
  - 2.7 鼻結痂皮及分泌物增加
  - 2.8 影響面容
  - 2.9 疤痕影響外觀
  - 2.10 硬腭及牙齒缺損
  - 2.11 面中部麻痺
  - 2.12 受影響的眼過量流淚
  - 2.13 下眼皮外翻
3. 不常見的嚴重風險或併發症
  - 3.1 嚴重流血不止
  - 3.2 呼吸道阻塞引致窒息
  - 3.3 面容嚴重受損
  - 3.4 複視或失去視力
  - 3.5 面中部皮膚壞死
  - 3.6 口部不能張開
  - 3.7 嚴重影響進食，需用喉管輔助進食。
  - 3.8 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡
4. 不治療的後果
  - 4.1 病情惡化
  - 4.2 腫瘤出血
  - 4.3 腫瘤變大影響容貌
  - 4.4 腫瘤影響眼睛引致喪失視力

### 其他治療 / 檢查方法

1. 放射治療
2. 化療
3. 舒緩治療
4. 局部腫瘤清創術

### 免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

### 參考資料

醫管局「智友站」網頁：上頷骨切除術 (2/2020)

病人簽署：\_\_\_\_\_ 簽署日期：\_\_\_\_\_

Patient's Label

Patient Name: \_\_\_\_\_

Hospital No: \_\_\_\_\_

Episode No: \_\_\_\_\_