



醫療程序須知

簡介

切除全部或部分頸淋巴結和鄰近組織

適應症

- 明確的頸淋巴轉移
- 疑似頸淋巴轉移
- 頸淋巴轉移評估

手術 / 程序過程

手術會在全身麻醉下進行。醫生會在頸部開一個切口，露出並辨認頸部組織，然後把病灶及受影響的淋巴結切除。插入引流管後，醫生會縫合傷口。

手術 / 程序前須知

1. 請告訴醫生你的醫療及服藥情況。藥物可能需要作恰當的增減
2. 預期結果
 - 2.1 徹底清除頸淋巴轉移
 - 2.2 評估頸淋巴擴散情況，對疾病作進一步治療計劃
 - 2.3 有機會不能全部清除病灶及有可能復發
3. 手術不能解決的問題
 - 3.1 病灶累及重要結構
 - 3.2 遠處轉移

手術 / 程序後須知

1. 手術後頸部會有傷口敷料及引流管，引流管把液體導往引流瓶，幾日後便會拆除。
2. 傷口疼痛乃屬正常，可服藥控制，你可能會出現肩無力的情況
3. 請依約期覆診

風險及併發症

1. 手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。
2. 常見副作用和併發症 (≥1% 風險)
 - 2.1 出血
 - 2.2 感染
 - 2.3 肩痛和抬肩乏力
 - 2.4 乳糜漏
 - 2.5 頸部皮膚麻痺
 - 2.6 淋巴腫
 - 2.7 疤痕增生或疤痕瘤
 - 2.8 局部畸形

Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Episode No: _____



3. 不常見的嚴重風險或併發症 (<1% 風險)
 - 3.1 皮膚壞死
 - 3.2 神經損傷
 - 3.2.1 面神經損傷，引致面癱和口角歪斜
 - 3.2.2 迷走神經損傷，引致聲音嘶啞
 - 3.2.3 副神經損傷，引致抬肩無力及疼痛
 - 3.2.4 舌下神經損傷，引致舌活動困難、語言和吞嚥問題
 - 3.2.5 臂叢神經損傷，引致上肢麻痺和癱瘓
 - 3.2.6 膈神經損傷，引致呼吸困難
 - 3.2.7 交感神經損傷，引致眼皮下垂、兩部乾燥
 - 3.3 顱內壓增高，引致頭痛、嘔吐、神經癱瘓
 - 3.4 氣胸引致呼吸困難
 - 3.5 腦血管意外
 - 3.6 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡
4. 不治療的後果
 - 4.1 病情惡化

其他治療 / 檢查方法

1. 放射治療
2. 化療
3. 觀察

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫管局「智友站」網頁：頸清掃 (2/2020)

Patient's Label
Patient Name: _____
Hospital No: _____
Episode No: _____

病人簽署：_____ 簽署日期：_____