



## 醫療程序須知

### 簡介

鼻及鼻中隔成形術是利用手術矯正鼻畸形，並拉直鼻中隔，保持鼻腔通暢。

### 適應症

- 先天鼻畸形
- 創傷、腫瘤或感染引致的繼發性後天鼻畸形。
- 進行鼻整形改善外觀

### 手術 / 程序過程

1. 切開鼻內外皮膚
2. 切除畸形鼻骨或軟骨
3. 如有需要可植入取自身體其他部分的軟骨
4. 可使用植入物塑造鼻形

### 手術 / 程序前須知

1. 告知醫生其本身患有的其他疾病，如糖尿病、心臟病、高血壓及定時服用的藥物，包括中藥及保健食品。
2. 遵從醫護人員指示，在需要時禁食。
3. 其他手術前準備或檢查
4. 預期結果
  - 4.1 為先天或後天的鼻畸形患者改善鼻形
  - 4.2 為先天或後天的鼻畸形患者改善鼻腔通氣
  - 4.3 按手術前與外科醫生訂定的手術目標，改善鼻的外觀。
  - 4.4 因罕見地完全失去鼻骨而重新造鼻

### 手術 / 程序後須知

1. 手術後可能需要服止痛藥
2. 睡覺時頭部略為墊高，有助減少手術後出現水腫情況。
3. 不應擤鼻
4. 通常可在一至兩星期後恢復正常活動
5. 或需用洗鼻器或鹽水噴鼻器洗鼻
6. 覆診時或需由醫生清理凝血及乾硬黏液
7. 如嚴重出血、虛脫、劇痛、發燒或有傷口感染跡象，應立即求醫。

**Patient's Label**

Patient Name: \_\_\_\_\_

Hospital No: \_\_\_\_\_

Episode No: \_\_\_\_\_



### 風險及併發症

1. 手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。
2. 常見副作用和併發症
  - 2.1 輕微出血
  - 2.2 感到痛楚，但一般屬輕微及可以舒緩。
  - 2.3 切取軟骨部位有痛楚、血腫、感染及變形。
  - 2.4 出現鼻塞，但通常在一星期內改善。
  - 2.5 續至 8 星期的鼻炎
  - 2.6 因截骨導致眼眶周及上頰瘀傷，但會在 3 至 4 星期內消退。
  - 2.7 輕微殘餘鼻畸形
3. 不常見的嚴重風險或併發症
  - 3.1 嚴重出血
  - 3.2 鼻中隔血腫
  - 3.3 鼻中隔感染
  - 3.4 鼻中隔貫穿
  - 3.5 感染或植入物從皮外傷口或鼻內擠出
  - 3.6 持續鼻塞
  - 3.7 鼻腔黏連
  - 3.8 膠布或紮帶過敏反應
  - 3.9 嚴重鼻畸形：鞍鼻、鼻樑下陷及鼻扁塌。
  - 3.10 失去嗅覺
  - 3.11 腦脊液漏
  - 3.12 中毒性休克綜合症
  - 3.13 由於手術及麻醉的嚴重併發症引致死亡
4. 不治療的後果
  - 4.1 持續鼻畸形
  - 4.2 持續鼻塞

### 其他治療 / 檢查方法

1. 接受鼻畸形，不作治療。
2. 使用藥物以改善鼻氣道

### 免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

### 參考資料

醫管局「智友站」網頁：鼻及鼻中隔成形術 (2/2020)

病人簽署：\_\_\_\_\_ 簽署日期：\_\_\_\_\_

<b>Patient's Label</b> Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____
--