



## 醫療程序須知

### 簡介

切除固定鐙骨及植入人工鐙骨

### 適應症

- 耳硬化症引致的傳導性耳聾
- 其它病變引致鐙骨固定的傳導性耳聾

### 手術 / 程序過程

手術會在全身或局部麻醉下進行。醫生會小心掀起耳膜，切除部份硬化鐙骨，植入人工小鐙骨，然後再把耳膜復位。

### 手術 / 程序前須知

1. 請告訴醫生你的醫療及服藥情況。藥物可能需要作恰當的增減。
2. 預期結果
  - 2.1 改善聽力
  - 2.2 有可能不能全部清除病灶和有可能復發
3. 手術不能解決的問題
  - 3.1 耳鳴
  - 3.2 頭暈
  - 3.3 感音神經性耳聾

### 手術 / 程序後須知

1. 手術後耳朵可能有痛楚或阻塞的感覺。隨後幾日並可能會頭暈。手術後的幾星期內應避免擤鼻涕或從事劇烈體育活動。
2. 醫生會在你的耳內置入敷料。請勿自行除走。醫生會在覆診時為你拆除。
3. 少量耳溢液乃屬正常。請勿讓水流入耳內。
4. 依時覆診。

Patient's Label

Patient Name: \_\_\_\_\_

Hospital No: \_\_\_\_\_

Episode No: \_\_\_\_\_



### 風險及併發症

1. 手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。
2. 常見副作用和併發症 ( $\geq 1\%$  風險)
  - 2.1 對耳道填塞物過敏
  - 2.2 感染
  - 2.3 出血
  - 2.4 失去味覺或味覺紊亂
  - 2.5 耳鳴
  - 2.6 暈眩
  - 2.7 聽力損害
3. 不常見的嚴重風險或併發症 ( $< 1\%$  風險)
  - 3.1 全聾
  - 3.2 耳膜穿孔
  - 3.3 面神經損傷，引致面癱。
  - 3.4 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡
4. 不治療的後果
  - 4.1 聽力繼續下降

### 其他治療 / 檢查方法

1. 觀察病情進展，再作打算。
2. 助聽器

### 免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

### 參考資料

醫管局「智友站」網頁：鐙骨切除術 (2/2020)

|  |
|--|
| <b>Patient's Label</b><br>Patient Name: _____<br>Hospital No: _____<br>Episode No: _____ |
|--|

病人簽署：\_\_\_\_\_ 簽署日期：\_\_\_\_\_