



醫療程序須知

簡介

宮腔鏡檢查(Hysteroscopy)是用一支直徑約為四毫米的儀器，窺視子宮內腔的情況，以辨別子宮腔內病變。

適應症

- 不正常子宮出血
- 荷爾蒙治療失效
- 子宮內膜抽吸術失敗 / 超音波檢查發現異常幫助診斷子宮腔內病變

手術 / 程序過程

1. 可能需要麻醉 / 局部 / 區域 / 全身麻醉
2. 窺鏡經陰道和子宮頸進入子宮
3. 可能需要擴張子宮頸
4. 觀察子宮腔
5. 可能需要抽取子宮內膜組織或刮宮
6. 除非特別聲明，所有取出的組織會送交病理化驗部或依慣常程序處理
7. 手術期間可能要採用的其他相關步驟如擴張子宮頸、息肉切除及需要時以宮腔鏡輔助

手術 / 程序前須知

1. 醫生解釋手術原因、程序及可能發生之併發症，簽署手術同意書。
2. 手術前六小時開始禁止飲食，以減低手術時嘔吐之危險。
3. 除去身上所有衣物(包括內衣褲)和物件，例如假牙、飾物和隱形眼鏡等，換上手術衣著。
4. 檢查前，請先行排清小便。

手術 / 程序後須知

1. 有些病人會出現子宮痙攣性疼痛，此症狀會於數小時後減退。病人只需稍作休息便可，必要時可索取止痛藥。
2. 手術後無需特別處理，通常會有少量的陰道出血，此情況會維持三至四天；甚至持續一至兩星期才完全停止。
3. 此程序只作診斷性質，並沒有治療作用，有可能需要再進行手術。

風險及併發症

1. 由鬆弛子宮頸藥物引起的副作用包括噁心、嘔吐、腹瀉、發燒、誘發哮喘、過敏等
2. 麻醉併發症
3. 子宮頸撕裂
4. 子宮穿孔 (機會少於1%) 甚至附近器官受損傷，因而需要作出修補手術
5. 盤腔感染
6. 病變過小以致未能發現

Patient's Label

Patient Name: _____
 Hospital No: _____
 Episode No: _____



其他治療 / 檢查方法


- 觀察
- 盆腔超音波檢查
- 子宮內膜抽吸術

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

1. 基督教聯合醫院婦產科手術前資料：宮腔鏡檢查 (2018)
2. 基督教聯合醫院婦產科手術前資料：子宮內膜活組織檢查 (2017)



Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Episode No: _____

病人簽署：_____ 簽署日期：_____