



## 醫療程序須知

### 簡介

利用宮腔鏡置入電切器，經陰道及子宮頸到達宮腔，把肌瘤 / 息肉剔除，然後止血。

### 適應症

- 子宮內膜肌肉瘤或息肉
- 不正常子宮出血 / 子宮內腔變形

### 手術 / 程序過程

1. 全身麻醉 / 區域性麻醉
2. 擴張子宮頸
3. 插入切除鏡
4. 注入甘氨酸 / 生理鹽水以膨脹宮腔
5. 宮腔鏡直接監察下進行切除肌瘤 / 息肉及止血
6. 除非特別聲明，所有取出的組織會送交病理化驗部或依慣常程序處理
7. 手術期間可能要採用其他相關步驟如輸血

### 手術 / 程序前須知

1. 需簽署手術同意書
2. 於手術前 6 小時開始禁飲食
3. 使用米索前列醇鬆弛子宮頸
4. 除去身上所有衣物 (包括內衣褲) 和物品，例如假牙、飾物和隱形眼鏡等，換上手術衣著
5. 往手術室前先排清小便

### 手術 / 程序後須知

1. 全身麻醉後，病人或會感到疲倦、渴睡、噁心及嘔吐，如情況持續或加劇，請通知醫護人員
2. 手術後兩週內或有陰道出血現象
3. 行經期婦女在手術前有使用過藥物(荷爾蒙藥物)，藥力過後會再有月經

#### Patient's Label

Patient Name: \_\_\_\_\_

Hospital No: \_\_\_\_\_

Episode No: \_\_\_\_\_



### 風險及併發症

1. 麻醉併發症
2. 由鬆弛子宮頸藥物引起的副作用如噁心、嘔吐、腹瀉、發燒、誘發哮喘、過敏等
3. 出血，可能需要輸血
4. 盤腔感染
5. 子宮頸撕裂
6. 子宮穿孔及有機會損傷附近器官，可能需要剖腹探查或修補
7. 甘氨酸攝入過多
8. 切除未能完成而需要再進行手術
9. 復發

### 其他治療 / 檢查方法


子宮切除術

### 免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

### 參考資料

基督教聯合醫院婦產科手術前資料：宮腔鏡肌肉瘤 / 息肉切除 (2017)



<p><b>Patient's Label</b>          Patient Name: _____          Hospital No: _____          Episode No: _____</p>
---

病人簽署：\_\_\_\_\_ 簽署日期：\_\_\_\_\_