香港浸信會醫院
Hong Kong Baptist Hospital

分段二氧化碳激光 (Re:pair)
Fraxel (Re:pair)

分段二氧化碳激光 (Re:pair) Fraxel (Re:pair)

医疗程序须知

简介

二氧化碳分段激光在皮肤上制造许多微细的伤口及加热区域，能深入皮肤，启动胶原蛋白增生以及皮肤自我修复，令皮肤回复健康。

适应症

可使用于身体任何部位，疗效包括：

- 收复暗疮疤痕
- 收细毛孔
- 改善疲态肤质
- 改善创伤性手术疤痕
- 减细皱纹
- 收紧皮肤

手术 / 程序前须知

1. 可能需要使用局部麻醉。
2. 治疗可能需要分多次进行，而且未必能将疤痕及痕迹全部清除。
3. 此疗程所造之改善程度并无任何保证。
4. 治疗前后之部位需接受摄影，以作治疗进度之参考。
5. 以上治疗均存在复发机会。

手术 / 程序后须知

1. 治疗后可能引起暂时的灼热感。
2. 治疗后会出现损皮及结痂，约一星期或更长时间回复正常。
3. 依照治疗程度的不同，皮肤可出现红肿，一般需时 1-3 个月或更长时间回复正常。
4. 治疗之皮肤，色素变深或变浅，一般需时 1-3 个月或更长时间回复正常，情况因个人皮肤而异。
5. 治疗后可能会出现轻微的脱皮情况，使用保湿产品可改善现象。
6. 保护皮肤避免阳光曝晒，选用 SPF30 或以上的防晒产品。

风险及并发症

1. 治疗之皮肤可能出现浮肿、损皮、水泡、结痂、皮肤色素变深及疤痕形成，因而需要其他治疗。
2. 不适当料理受治疗部位之皮肤可能产生痕迹或皮肤组织之改变。

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

Soltamedical - Fraxel Re:pair Leaflet

Patient's Label
Patient Name: _____
Hospital No:_____
Adm No/Episode No:_____

病人签署：_____ 日期：_____