



醫療程序須知

簡介

將類固醇針藥局部注入在疤痕，可抑制膠原，縮少疤痕。

適應症

- 疤痕增生
- 疤痕痕癢
- 暗瘡凸疤痕
- 手術後凸疤痕

手術 / 程序前須知

1. 需簽署同意書。
2. 此療程需由醫生施行。
3. 需要時使用局部麻醉。
4. 治療可能需要分多次進行，治療效果可因人而異。
5. 療程效果並無任何保證。
6. 治療前後之部位或需接受攝影，以作治療進度之參考。

手術 / 程序後須知

1. 治療之皮膚可能出現凹凸痕跡。
2. 色素變深或變淺。大多數色素可回復正常，一般需時 1- 3 個月或更長時間。
3. 治療之皮膚可能出現血管增生。

風險及併發症

因應不同人有不同皮膚狀況，注射後可能產生痕跡或皮膚組織之改變。

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Adm No/Episode No: _____

病人簽署：_____ 簽署日期：_____