



醫療程序須知

簡介

表皮磨皮使用真空吸力及細小的晶體去除角質層（皮膚表皮的最外層）。這技術刺激表皮細胞更新及真皮膠原蛋白重組。

適應症

1. 暗瘡
2. 暗瘡疤痕
3. 光老化 – 幼紋和毛孔粗大
4. 色素沉著

手術 / 程序前須知

1. 需要時或與其他方式結合治療，如藥物治療或藍光治療。
2. 可能需要多次治療，而且未必能全部清除。
3. 改善程度並無任何保證，治療反應因人而異。
4. 治療均存在復發機會。
5. 治療前後均需拍照記錄，以作治療進度之參考。

手術 / 程序後須知

1. 治療後的暗瘡部位可能會有輕微出血。
2. 治療後皮膚會紅腫，可能會持續 1-2 天。
3. 治療後可恢復使用護膚產品和化妝品。

風險及併發症

1. 瘀傷。
2. 暫時性色素沉著。

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

1. Shah M, Crane JS. Microdermabrasion. [Updated 2019 Sep 18]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535383/>
2. M Fernandes et al. Effects of microdermabrasion on skin rejuvenation. J Cosmet and Laser Therapy 2014.16:26-31
3. A F Taub. Procedural treatments for acne vulgaris. Derm Surg 2007.33(9):1005-1026

病人簽署：_____ 簽署日期：_____

Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Episode No: _____