



## 醫療程序須知

### 簡介

藍光用於殺滅暗瘡細菌，抑制皮脂腺，從而防止暗瘡產生。

### 適應症

- 暗瘡

### 手術 / 程序前須知

1. 治療過程可能有微熱感覺，治療時間約15分鐘。
2. 需要時或與其他方式結合治療，如藥物治療或表皮磨皮治療。
3. 可能需要多次治療，而且未必能全部清除。
4. 改善程度並無任何保證，治療反應因人而異。
5. 治療均存在復發機會。
6. 治療前後均需拍照記錄，以作治療進度之參考。

### 手術 / 程序後須知

1. 治療後可以恢復日常皮膚護理。

### 風險及併發症

1. 泛紅、腫脹、起泡、感染、疤痕和色素沉著。
2. 色素沉著可能持續1-6個月或更長時間，視乎皮膚類型。

### 免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

### 參考資料

1. Ablon G. Phototherapy with Light Emitting Diodes: Treating a Broad Range of Medical and Aesthetic Conditions in Dermatology. J Clin Aesthet Dermatol. 2018;11(2):21 - 27.
2. A F Taub. Procedural treatments for acne vulgaris. Derm Surg 2007.33(9):1005-1026

病人簽署：\_\_\_\_\_ 簽署日期：\_\_\_\_\_

<b>Patient's Label</b> Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____
--