



## 醫療程序須知

### 簡介

二氧化碳分段激光在皮膚上製造許多微細的傷口及加熱區域，能深入皮膚，啟動膠原蛋白增生以及皮膚自我修復，令皮膚回復健康。

### 適應症

可使用於身體任何皮膚部位，療效包括：

- 收復暗瘡疤痕
- 收細毛孔
- 改善疲態膚質
- 改善創傷性手術疤痕
- 減細皺紋
- 收緊皮膚

### 手術 / 程序前須知

1. 可能需要使用局部麻醉。
2. 治療通常需要分多次進行，而且未必能將疤痕及痕跡全部清除。
3. 此療程所造之改善程度並無任何保證。
4. 治療前後之部位需接受攝影，以作治療進度之參考。
5. 以上治療均存在復發機會。

### 手術 / 程序後須知

1. 治療後可能引起暫時的灼熱感。
2. 治療後會出現損皮及結痂，約一星期或更長時間回復正常。
3. 依照治療程度的不同，皮膚可出現紅腫，一般需時 1-3 個月或更長時間回復正常。
4. 治療之皮膚，色素變深或變淺，一般需時 1-3 個月或更長時間回復正常，情況因個人皮膚而異。
5. 治療後可能會出現輕微的脫皮情況，使用保濕產品可改善現象。
6. 保護皮膚避免陽光曝曬，選用 SPF30 或以上的防曬產品。

### 風險及併發症

1. 治療之皮膚可能出現浮腫、損皮、水泡、結痂、皮膚色素變深及疤痕形成，因而需要其他治療。
2. 不適當料理受治療部位之皮膚可能產生痕跡或皮膚組織之改變。

### 免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

### 參考資料

Cho SB et al. The efficacy and safety of 10,600-nm carbon dioxide fractional laser for acne scars in Asian patients. *Derm Surg* 2009.35(12):1955-61.

#### Patient's Label

Patient Name: \_\_\_\_\_

Hospital No: \_\_\_\_\_

Episode No: \_\_\_\_\_

病人簽署：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_