



醫療程序須知

簡介

包皮是覆蓋在男性生殖器前端，保護龜頭的一圈皮。
初生嬰兒施行包皮環切術通常因為：(一)父母要求；(二)宗教理由。

手術 / 程序過程

1. 只需10 - 20分便可完成。
2. 按醫囑給予局部麻醉藥。
3. 醫生用特製的透明膠圈放置於包皮及龜頭之間，用不溶解之線材綁紮及把多餘的包皮切除。
4. 醫生或會因應嬰兒之情況作出不同之建議，詳情請與閣下之醫生商討。

手術 / 程序前須知

1. 醫生會向父母解釋手術過程、麻醉過程及可能發生的併發症。
2. 家長需簽署《接受醫療程序同意書》。
3. 按醫囑於手術前禁食。

手術 / 程序後須知

1. 住院期間的護理：
 - 1.1 須住院 1 - 2 天。
 - 1.2 術後首 4 - 6 小時會將嬰兒置於孵箱內觀察傷口情況。
 - 1.3 如傷口沾了糞便，需用生理鹽水沖洗，或按醫生的指示用消毒溶液沖洗。
 - 1.4 傷口不蓋紗布，只會蓋上油性網布或塗上油劑。
2. 出院後的護理和建議：
 - 2.1 不要試圖除去傷口上的透明膠圈，傷口癒合後膠圈會在術後7至10天自動脫落。
 - 2.2 傷口會有浮腫現象，1 - 2 星期內便會消失。傷口約 7 - 10 天可以痊癒。
 - 2.3 切勿將紙尿片包得過緊。
 - 2.4 術後可以洗澡。
 - 2.5 要注意衛生及保持傷口清潔乾爽，如傷口沾了糞便，需用生理鹽水或凍開水沖洗。
 - 2.6 傷口周圍如有無異味的黃色分泌物是正常的。但傷口如有異味、流膿、流血、長期紅腫，即需回院求診。
 - 2.7 請依時覆診。

風險及併發症

1. 傷口流血
2. 傷口感染
3. 傷口長期紅腫
4. 傷口有異味或流膿
5. 排尿困難
6. 切口收窄

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫管局「智友站」網頁：包皮環切術 (2018)

家長 / 監護人

簽署： _____ 日期： _____

Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Episode No: _____