



醫療程序須知

簡介

接受腹膜透析治療的腎病患者必需預先接受手術，將一條特別的導管植入腹腔內。這根導管是提供透析液進入腹腔的通路。

手術 / 程序過程

1. 醫生會將局部麻醉藥作皮下注射入肚臍對下的位置。
2. 局部麻醉後，會在該處開一個約 5 厘米長的傷口，當見到腹膜時，醫生會將導管的一端穿過腹膜放進腹腔內。而導管的另一端會橫向地穿過皮下脂肪，在距離傷口約 5-6 厘米處伸出體外。有醫生或會利用套管針和插管插入導管。
3. 整個手術過程需時約一個多小時。
4. 在特別情況下(例如兒童病患者或手術複雜)，手術亦會安排在全身麻醉 / 監察麻醉 / 靜脈麻醉下進行。

手術 / 程序前須知

1. 經醫生解釋施行手術的原因、過程及可能出現的併發症，病人明白後簽署手術同意書。
2. 有需要時可做灌腸通便。
3. 手術前用消毒液清洗沐浴。
4. 需要在手術前 4 至 6 小時禁止飲食。
5. 糖尿病人需按醫囑，於禁食時停用降血糖藥物，包括胰島素。
6. 血壓藥物亦需按醫囑服用。
7. 按醫囑於手術前指定日子停用阿士匹靈、其他抗血小板或薄血藥物。
8. 若有需要，用電動剃刀去除腹部毛髮。
9. 前往手術室前請小便，排空膀胱。如不能有效排空膀胱，則可能需要插排尿導管。

手術 / 程序後須知

1. 傷口會用無菌紗布遮蓋，病人要保持傷口乾爽與清潔。
2. 經主診腎科醫生或外科醫生評估後，恢復服用阿士匹靈、其他抗血小板或薄血藥物。
3. 病人若感到不適，請即通知醫護人員。
4. 約 14 天後，如傷口癒合正常，便可拆線。
5. 保持傷口四周乾爽，切勿搔癢導管出口及附近的皮膚，以免細菌感染，待植入的導管 4 至 6 星期後完全癒合，經護理人員指導後才可進行淋浴。
6. 術後病人或家屬需要學習更換透析液的技巧，熟習後便可在家中自行進行腹膜透析治療。
7. 在等候學習期間，病人可能需要接受間歇性腹膜或血液透析。
8. 病人需每日觀察及妥善護理導管及導管口。

Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Episode No: _____



風險及併發症

1. 此手術可能會引起下列的併發症：
傷口滲漏(12%)；傷口感染(7%)；傷口流血(5%)；穿腸(0.5 - 3.5%)；有生命危險(罕見但有機會發生)。
2. 其他可能會引起的問題包括：傷口疼痛；穿破其他器官例如膀胱及血管；腹膜炎；內出血；導管移位、閉塞和在傷口處出現疝等等。
3. 如有併發症發生，在必要的情況下，病人可能需要接受其他檢驗及有需要之外科手術，其中包括拔除導管手術，當情況穩定，病人可能需要接受另一次「植入導管」手術。

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

1. 醫管局「智友站」網頁：腹膜透析導管植入術 (2017)
2. Hong Kong College of Physicians, Hong Kong Society of Nephrology, Hospital Authority. (2019). Care of Patient for Insertion of Peritoneal Catheter. *Clinical Practice Guidelines for the Provision of Renal Services in Hong Kong*, 24(1), 86.

病人簽署：_____ 簽署日期：_____

「
Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Episode No: _____
」