



藥物常識



之

使用眼藥水的方法及須知



香港浸信會醫院
Hong Kong Baptist Hospital

(1) 用肥皂清洗手部。



(2) 頭部向後仰或躺臥床上。



(3) 用手指輕輕把下眼臉拉下成袋狀，眼向上望，手持藥瓶，擡瓶一下滴藥水入眼臉內。(切勿讓

滴咀接觸到眼睛或眼蓋，以免損害眼睛及染污滴管)



(4) 滴藥後輕閉上眼睛，(切勿用手擦眼及眨眼)，用清潔紙巾拭去眼皮多餘藥水。



(5) 以手指輕壓眼角鼻樑處數分鐘，以防止眼藥水流失。



(6) 用後必須立即蓋好藥瓶滴咀，切勿用清水洗濯。



* 如可能，請讓你家人或其他人替你滴眼藥水。

注意：

(I) 原裝封口的眼藥水是經消毒過的，在使用期內請保持它的清潔，滴眼水時請勿把瓶咀與眼部接觸。若開瓶後一個月仍未將眼藥水用完，應把它棄掉。

(II) 切勿使用已變色或過

期的藥水。

(III) 如同時使用兩種不同的藥水或眼藥膏，請重覆步序 3 至 5；使用期間應相隔數分鐘。

(IV) 為防止傳播病菌及避免耽誤病情，切勿將自己的眼藥水給予他人使用。

藥物指引只供參考之用。

用藥應按照醫生指示。

如有疑問請向主診醫生或藥房職員查詢。

藥物查詢熱線：23398964

The above information is for reference only .

If you have any problems, please consult your doctor or our pharmacy

Drug enquiry hotline: 23398964

香港浸信會醫院網址: www.hkbh.org.hk

HK Baptist Hospital website: www.hkbh.org.hk