




# 藥物常識



之


## 使用滴鼻藥水的方法及須知



(1) 用肥皂清洗手部。



(2) 用藥前把鼻孔清理及搖勻藥液。



(3) 坐在椅上，將頭部向後仰靠椅背；或躺臥床上，放枕頭在肩背下，令頭仰後。



(4) 滴鼻前先噴氣，將滴管對準鼻孔，小心地把所需劑量滴入鼻孔內。(切忌讓滴管接觸到鼻內壁，因為這會令你打噴嚏及染污滴管)



(5) 滴藥後，讓頭部保持後

仰約兩分鐘，使藥水流入鼻內。



(6) 不要沖洗或抹乾滴管，應立即放回藥水瓶內並蓋好。



\*如可能，請讓你家人或其他人替你滴鼻藥水。

注意：

- (I) 每次滴藥水最多一至兩滴，切勿長期使用以避免損壞鼻膜及產生不良副作用。
- (II) 不可使用已變色、變壞或過期的藥水。
- (III) 若開瓶後一個月仍未將滴鼻藥水用完，應把它棄掉。

藥物指引只供參考之用。

用藥應按照醫生指示。

如有疑問請向主診醫生或藥房職員查詢。

藥物查詢熱線: 23398964

The above information is for reference only .

If you have any problems, please consult your doctor or our pharmacy

Drug enquiry hotline: 23398964

香港浸信會醫院網址: [www.hkbh.org.hk](http://www.hkbh.org.hk)

HK Baptist Hospital website: [www.hkbh.org.hk](http://www.hkbh.org.hk)

05/2009