



医疗程序须知

简介

通过手术将乳腺管切除，以明确诊断乳头不寻常分泌物的病理及控制症状；如组织化验报告证实为恶性肿瘤，需再入院进行第二次手术。

适应症

乳头不寻常分泌物，例如出血。

手术 / 程序过程

1. 于全身麻醉或监察麻醉下进行。
2. 首先找出有不寻常分泌物的乳腺管乳头出口位置。
3. 可能会注入蓝色显影剂 (Methylene Blue) 或用导线引入乳腺管。
4. 在乳晕作一切口，将乳腺管切除。
5. 然后进行病理化验，以确定肿块性质。

手术 / 程序前须知

1. 入院前请除去所有饰物及抹去指甲油，请勿携带贵重物品或大量现金。
2. 入院时请带备个人清洁卫生用品，例如：睡衣、拖鞋等。
3. 手术当天或前一天入院，按医嘱需要时作术前常规检查：例如抽血、肺部 X 光、心电图、验小便等，并签署「接受医疗程序同意书」。
4. 麻醉科医生亦会作术前评估：解释禁饮食时间、全身麻醉可能引起的风险，并签署「接受麻醉同意书」。
5. 皮肤预备：手术前冲凉及洗头。
6. 往手术室前更换手术袍、戴帽，除去自己衣物包括内衣裤、饰物及假牙等，并先排清小便。

手术 / 程序后须知

1. 会量度生命表征及观察伤口的情况。
2. 全身麻醉后，喉咙可能感到疼痛不适、有痰，宜多作深呼吸运动，并用双手轻按腹部以助痰涎咳出。
3. 感觉恶心、呕吐或伤口疼痛，请通知护士，需要时可给予药物以减轻症状。
4. 伤口用无菌敷料及胶布遮盖，一般不用换症；当医生除去敷料检视伤口后，便会更换敷料，请保持伤口干爽清洁；如发现伤口敷料有任何异常，请通知当值护士。
5. 按医嘱正常均衡饮食，除因内科疾病需饮食限制外，一般无需戒口。
6. 可佩带合适胸罩，以舒适富盛托力为合。
7. 按医嘱开始活动，有助迅速康复。

<p>Patient's Label Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____</p>



风险及并发症

1. 伤口疼痛。
2. 伤口感染。
3. 伤口周围出现瘀肿(一般会自行消散，无需特别治疗)
4. 出血(可能需再施行手术清除血块)。
5. 乳头感觉敏感度下降。
6. 如最后组织化验报告证实为恶性肿瘤，需再入院进行第二次切除或其他跟进手术。

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出现常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

1. National Health Services, Information Sheet: Microdochectomy (Breast Duct Excision) (10/2014)
2. 医院管理局乳腺外科护理咨询小组资料单张：乳房护理系列 - 乳腺管切除术(2017)

病人签署：_____ 签署日期：_____

<p>Patient's Label Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____</p>
