



医疗程序须知

简介

通过此检查，协助诊断血管的各种病变。

手术 / 程序过程

1. 医生在病人的腹股沟间或手腕注射局部麻醉药。
2. 然后切开小部份表皮，用针穿刺血管后插入导管，进入大动脉，通过透视将导管移动至所需检查的血管，注入造影剂。
3. 如病人的腹股沟部位不适宜作穿刺，需在前臂弯的位置插入导管利用特备的 X 光仪器录取血管造影。
4. 最后拔出导管。
5. 病童通常需使用镇静剂或全身麻醉。
6. 检查须时约一至二小时。

手术 / 程序前须知

1. 检查前，医生会为病人检查血液凝结指数及尽可能矫正。
2. 如怀疑可能或已经怀孕，请先通知放射科职员。
3. 如曾患哮喘、风疹、湿疹、敏感性、鼻炎、对某些食物、药物及 X 光造影剂有过敏反应，请事先通知医生。
4. 需签署同意书。
5. 检查前六小时不可饮食。糖尿病人请遵照医生指示调节药份。
6. 手术部位的体毛须剃光及清洁。
7. 检查前须排清小便。
8. 检查进行时，请听从医护人员指导。

手术 / 程序后须知

1. 拔出导管后，伤口部位须按压约十分钟止血。
2. 检查后，病人须回病房休息及接受观察。

风险及并发症

1. 并发症的机会一般很少。
2. 对造影剂产生过敏反应。
3. 穿刺部位出血，或形成血肿。
4. 伤口附近的组织如受到感染、会有肿痛或渗液。
5. 血管栓塞。
6. 检查组织受破坏。

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出现常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

医管局「智友站」网页：血管造影检查（2010）

Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Episode No: _____

病人签署：_____ 签署日期：_____