



医疗程序须知

简介

在正常情况腹腔里只会有少量的液体存在。但是在某些疾病影响下，液体会在腹腔中累积。这些液体为腹水；腹腔穿刺术就是抽取腹水以用作检查或治疗用途的一种技术。

适应症

- 检查用途：为原因不明的腹水作病理性诊断。
- 治疗用途：较大量的腹水会被抽出以减轻因腹水所造成的腹部疼痛或呼吸困难。

手术 / 程序过程

1. 病人会被要求平躺于床上，或按需要采其他体位配合引流或抽取腹水。
2. 医生会先在施针的位置进行皮肤消毒。
3. 然后医生会在下针的位置施加局部麻醉药。
4. 待药力生效后，随即将刺针穿透皮肤进入腹腔，并用针筒抽取腹水。
5. 医生会抽出适量的腹水，以达到检查或治疗的目的。

手术 / 程序前须知

1. 病人需签署手术同意书。
2. 于程序前小便。



手术 / 程序后须知

1. 检查完成后，病人需遵医嘱在床上休息。
2. 医护人员将紧密监察病人之血压、脉搏，以观察并发症有否出现。

风险及并发症

一般来说，这是一个风险相对较低的检查。但基于病人的个别因素，还是会有并发症的出现。罕见但严重的并发症，包括严重内出血、感染、肾衰竭、低钠症、肝昏迷、肠脏意外被刺穿或腹水渗漏。

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出现常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

Runyon, B. A., Chopra, S. & Robson, K. M. (2017). Diagnostic and Therapeutic abdominal paracentesis. *UpToDate*. Retrieved on 15/11/2018 from https://www.uptodate.com/contents/diagnostic-and-therapeutic-abdominal-paracentesis?search=abdominal%20paracentesis&source=search_result&selectedTitle=1~76&usage_type=default&display_rank=1

病人签署：_____ 签署日期：_____

Patient's Label

Patient Name: _____
Hospital No: _____
Episode No: _____