



## 医疗程序须知

### 简介

1. 切开耳廓引流液体 / 血液
2. 在伤口缝上棉花纱布，防止体液 / 血液再积聚。

### 适应症

- 耳血肿
- 耳廓软骨积液

### 手术 / 程序过程

1. 局部麻醉 / 全身麻醉
2. 切开肿胀处
3. 引流患处的积液
4. 止血
5. 缝上棉花纱布，防止液体/血液再积聚。

### 手术 / 程序前须知

1. 告知医生其本身患有的其他疾病，如糖尿病、心脏病、高血压及定时服用的药物，包括中药及保健食品。
2. 遵从医护人员指示，在需要时禁食。
3. 其他手术前准备或检查
4. 预期结果
  - 4.1 迅速纾缓耳廓肿胀及痛楚
  - 4.2 防止耳廓变形
5. 手术不能解决的问题
  - 5.1 非因液体/血液积聚引致的耳廓肿胀

### 手术 / 程序后须知

1. 大约在一星期后除去棉花纱布
2. 手术后可出院回家
3. 预约复诊除去棉花纱布
4. 保持伤口清洁干爽
5. 出院后可恢复正常活动
6. 如严重出血、伤口红肿或有渗液、疼痛、发烧或发冷，应尽快求医。

#### Patient's Label

Patient Name: \_\_\_\_\_  
Hospital No: \_\_\_\_\_  
Episode No: \_\_\_\_\_



#### 风险及并发症

1. 手术有一些副作用和并发症风险，医务人员将尽力减少副作用和并发症风险。
2. 常见副作用和并发症 (≥1% 风险)
  - 2.1 液体 / 血液再积聚
  - 2.2 出血
  - 2.3 感染
  - 2.4 疤痕/疤痕瘤
3. 不常见的严重风险或并发症 (<1% 风险)
  - 3.1 耳廓变形
  - 3.2 皮肤缺血/坏死
  - 3.3 耳廓软骨膜炎
4. 不治疗的后果
  - 4.1 感染
  - 4.2 耳廓变形

#### 其他治疗 / 检查方法

1. 重复抽吸
2. 不作治疗

#### 免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出的常见风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

#### 参考资料

医管局「智友站」网页：钉钮(切开耳廓引流积液) (2/2020)

<p><b>Patient's Label</b>          Patient Name: _____          Hospital No: _____          Episode No: _____</p>
---

病人签署：\_\_\_\_\_ 签署日期：\_\_\_\_\_