



醫療程序須知

簡介

切除下鼻甲

適應症

下鼻甲肥大引致的鼻塞

手術 / 程序過程

醫生會以手術儀器經鼻孔切除鼻腔內肥大的下鼻甲

手術 / 程序前須知

1. 請告訴醫生你的醫療及服藥情況。藥物可能需要作恰當的增減。
2. 預期結果
 - 2.1 緩解鼻塞
 - 2.2 有可能不會完全改善鼻塞和有可能復發
3. 手術不能解決的問題
 - 3.1 非下鼻甲肥厚引致的鼻塞

手術 / 程序後須知

1. 手術後兩邊鼻孔都會塞入鼻敷料，所以你可能要用口呼吸，敷料會於一至兩日後取走，取走敷料後可能有輕微出血，但通常都會自行止血。
2. 敷料取去後，你可以出院回家。鼻水帶有少量血絲乃正常現象。你亦可能感到鼻塞。假如流血持續不止，請前往最近的急症室求診。
3. 請依約期復診。

風險及併發症

1. 手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。
2. 常見副作用和併發症 ($\geq 1\%$ 風險)
 - 2.1 出血
 - 2.2 持續鼻塞
 - 2.3 感染
 - 2.4 鼻腔粘連
 - 2.5 暫時痂皮
3. 不常見的嚴重風險或併發症 ($< 1\%$ 風險)
 - 3.1 萎縮性鼻炎
 - 3.2 咽鼓管損傷
 - 3.3 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡
4. 不治療的後果
 - 4.1 持續鼻塞

Patient's Label

Patient Name: _____
Hospital No: _____
Episode No: _____



其他治疗 / 检查方法

药物治疗

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出现常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

医管局「智友站」网页：下鼻甲减容术 (2/2020)

<p>Patient's Label Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____</p>

病人签署：_____ 签署日期：_____