



医疗程序须知

简介

切除中耳及乳突气房病灶

适应症

- 胆脂瘤
- 急性乳突炎
- 慢性化脓性中耳炎和乳突炎
- 肿瘤

手术 / 程序过程

1. 手术会在全身麻醉下进行
2. 皮肤切口会在耳前或耳后
3. 乳突内的病灶会在显微镜下切除
4. 在大多情况下，手术后伤口需加压包扎
5. 如有需要会用面神经显示监察

手术 / 程序前须知

1. 请告诉医生你的医疗及服药情况，药物可能需要作恰当的增减。
2. 手术前可能需要剃除耳旁边毛发
3. 预期结果
 - 3.1 清除胆脂瘤
 - 3.2 处理中耳和乳突感染
 - 3.3 有机会不能完全减轻症状和有可能复发
 - 3.4 清除肿瘤
4. 手术不能解决的问题
 - 5.1 耳鸣
 - 5.2 晕眩
 - 5.3 弱听

手术 / 程序后须知

1. 耳朵可能会出现痛楚或阻塞的感觉
2. 压力敷料通常会在一日后拆除，请切勿自行拆除耳内敷料。医生在复诊时，会替你更换或拆除敷料。
3. 耳朵排出一些分泌物乃属正常。请切勿让水流入耳内。

⌈ **Patient's Label** ⌋

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Episode No: _____

⌋



风险及并发症

1. 手术有一些副作用和并发症风险，医务人员将尽力减少副作用和并发症风险。
2. 常见副作用和并发症 ($\geq 1\%$ 风险)
 - 2.1 复发或残留
 - 2.2 感染
 - 2.3 出血
 - 2.4 传导性弱听加重
 - 2.5 味觉失去或味觉紊乱
 - 2.6 对耳道填塞物过敏
 - 2.7 晕眩
3. 不常见的严重风险或并发症 ($<1\%$ 风险)
 - 3.1 面瘫
 - 3.2 失去部份或全部听力
 - 3.3 耳道狭窄
 - 3.4 耳廓变形
 - 3.5 颅内损伤，导致感染和出血。
 - 3.6 由于手术或麻醉的严重并发症引致死亡
4. 不治疗的后果
 - 4.1 疾病恶化和出现并发症

其他治疗 / 检查方法

1. 定期耳道清洁和药物治疗
2. 抗菌素滴耳

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出现常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

医管局「智友站」网页：乳突切除术 (2/2020)

Patient's Label
Patient Name: _____
Hospital No: _____
Episode No: _____

病人签署：_____ 签署日期：_____