



医疗程序须知

简介

摘除整个或部分上颌窦壁、内含物及相连结构。

适应症

- 上颌窦及硬腭恶性或良性瘤
- 通往上颌窦的相连结构
- 结合其他手术，治疗同时涉及上颌窦的面中部恶性肿瘤。
- 罕见的严重上颌窦感染，须进行上颌窦清创术。

手术 / 程序过程

1. 可采用开放性或内窥镜手术
2. 开放性手术会在鼻边缘及眼下部切开，上唇可能切开
3. 摘除肿瘤及上颌窦部分或全部内壁

手术 / 程序前须知

1. 告知医生其本身患有的其他疾病，如糖尿病、心脏病、高血压及定时服用的药物，包括中药及保健食品。
2. 遵从医护人员指示，在需要时禁食。
3. 其他手术前准备或检查
4. 预期结果
 - 4.1 完全摘除上颌窦或硬腭肿瘤
 - 4.2 有机会未完全摘除肿瘤或感染，引致复发。
5. 手术不能解决的问题
 - 5.1 病灶蔓延至上颌窦周围的重要结构
 - 5.2 远处转移

手术 / 程序后须知

1. 可能需用义体修补硬腭及牙齿缺损
2. 手术后可能需要服用止痛药
3. 睡觉时头部略为垫高，有助减少手术后出现水肿情况。
4. 不应擤鼻
5. 在手术后数星期应避免进行剧烈运动或身体接触类体育运动
6. 如有咀嚼、吞咽或说话困难，可能需要饮食辅导及言语治疗。
7. 依时复诊
8. 如严重出血、虚脱、剧痛、发烧或有伤口感染迹象，应立即求医。

风险及并发症

1. 手术有一些副作用和并发症风险，医务人员将尽力减少副作用和并发症风险。

Patient's Label

Patient Name: _____
Hospital No: _____
Episode No: _____



2. 常见副作用和并发症
 - 2.1 出血
 - 2.2 感染
 - 2.3 张开口腔困难
 - 2.4 受影响的一边口腔咀嚼困难
 - 2.5 进食和喝水时返呛
 - 2.6 说话鼻音重
 - 2.7 鼻结痂皮及分泌物增加
 - 2.8 影响面容
 - 2.9 疤痕影响外观
 - 2.10 硬腭及牙齿缺损
 - 2.11 面中部麻痹
 - 2.12 受影响的眼过量流泪
 - 2.13 下眼皮外翻
3. 不常见的严重风险或并发症
 - 3.1 严重流血不止
 - 3.2 呼吸道阻塞引致窒息
 - 3.3 面容严重受损
 - 3.4 复视或失去视力
 - 3.5 面中部皮肤坏死
 - 3.6 口部不能张开
 - 3.7 严重影响进食，需用喉管辅助进食。
 - 3.8 由于手术或麻醉的严重并发症引致死亡
4. 不治疗的后果
 - 4.1 病情恶化
 - 4.2 肿瘤出血
 - 4.3 肿瘤变大影响容貌
 - 4.4 肿瘤影响眼睛引致丧失视力

其他治疗 / 检查方法

1. 放射治疗
2. 化疗
3. 纾缓治疗
4. 局部肿瘤清创术

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出的常见风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

医管局「智友站」网页：上颌骨切除术 (2/2020)

<p>Patient's Label Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____</p>

病人签署：_____ 签署日期：_____