



医疗程序须知

简介

鼻及鼻中隔成形术是利用手术矫正鼻畸形，并拉直鼻中隔，保持鼻腔通畅。

适应症

- 先天鼻畸形
- 创伤、肿瘤或感染引致的继发性后天鼻畸形。
- 进行鼻整形改善外观

手术 / 程序过程

1. 切开鼻内外皮肤
2. 切除畸形鼻骨或软骨
3. 如有需要可植入取自身体其他部分的软骨
4. 可使用植入物塑造鼻形

手术 / 程序前须知

1. 告知医生其本身患有的其他疾病，如糖尿病、心脏病、高血压及定时服用的药物，包括中药及保健食品。
2. 遵从医护人员指示，在需要时禁食。
3. 其他手术前准备或检查
4. 预期结果
 - 4.1 为先天或后天的鼻畸形患者改善鼻形
 - 4.2 为先天或后天的鼻畸形患者改善鼻腔通气
 - 4.3 按手术前与外科医生订定的手术目标，改善鼻的外观。
 - 4.4 因罕见地完全失去鼻骨而重新造鼻

手术 / 程序后须知

1. 手术后可能需要服止痛药
2. 睡觉时头部略为垫高，有助减少手术后出现水肿情况。
3. 不应擤鼻
4. 通常可在一至两星期后恢复正常活动
5. 或需用洗鼻器或盐水喷鼻器洗鼻
6. 复诊时或需由医生清理凝血及干硬黏液
7. 如严重出血、虚脱、剧痛、发烧或有伤口感染迹象，应立即求医。

Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Episode No: _____



风险及并发症

1. 手术有一些副作用和并发症风险，医务人员将尽力减少副作用和并发症风险。
2. 常见副作用和并发症
 - 2.1 轻微出血
 - 2.2 感到痛楚，但一般属轻微及可以纾缓。
 - 2.3 切取软骨部位有痛楚、血肿、感染及变形。
 - 2.4 出现鼻塞，但通常在一星期内改善。
 - 2.5 续至8星期的鼻炎
 - 2.6 因截骨导致眼眶周及上颊瘀伤，但会在3至4星期内消退。
 - 2.7 轻微残余鼻畸形
3. 不常见的严重风险或并发症
 - 3.1 严重出血
 - 3.2 鼻中隔血肿
 - 3.3 鼻中隔感染
 - 3.4 鼻中隔贯穿
 - 3.5 感染或植入物从皮外伤口或鼻内挤出
 - 3.6 持续鼻塞
 - 3.7 鼻腔黏连
 - 3.8 胶布或扎带过敏反应
 - 3.9 严重鼻畸形：鞍鼻、鼻梁下陷及鼻扁塌。
 - 3.10 失去嗅觉
 - 3.11 脑脊液漏
 - 3.12 中毒性休克综合症
 - 3.13 由于手术及麻醉的严重并发症引致死亡
4. 不治疗的后果
 - 4.1 持续鼻畸形
 - 4.2 持续鼻塞

其他治疗 / 检查方法

1. 接受鼻畸形，不作治疗。
2. 使用药物以改善鼻气道

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出的常见风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

病人签署：_____ 签署日期：_____

Patient's Label Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____
--