



医疗程序须知

简介

接受腹膜透析治疗的肾病患者必需预先接受手术，将一条特别的导管植入腹腔内。这根导管是提供透析液进入腹腔的通路。

手术 / 程序过程

1. 医生会将局部麻醉药作皮下注射入肚脐对下的位置。
2. 局部麻醉后，会在该处开一个约 5 厘米长的伤口，当见到腹膜时，医生会将导管的一端穿过腹膜放进腹腔内。而导管的另一端会横向地穿过皮下脂肪，在距离伤口约 5-6 厘米处伸出体外。有医生或会利用套管针和插管插入导管。
3. 整个手术过程需时约一个多小时。
4. 在特别情况下(例如儿童病患者或手术复杂)，手术亦会安排在全身麻醉 / 监察麻醉 / 静脉麻醉下进行。

手术 / 程序前须知

1. 经医生解释施行手术的原因、过程及可能出现的并发症，病人明白后签署手术同意书。
2. 有需要时可做灌肠通便。
3. 手术前用消毒液清洗沐浴。
4. 需要在手术前 4 至 6 小时禁止饮食。
5. 糖尿病人需按医嘱，于禁食时停用降血糖药物，包括胰岛素。
6. 血压药物亦需按医嘱服用。
7. 按医嘱于手术前指定日子停用阿士匹灵、其他抗血小板或薄血药物。
8. 若有需要，用电动剃刀去除腹部毛发。
9. 前往手术室前请小便，排空膀胱。如不能有效排空膀胱，则可能需要插排尿导管。

手术 / 程序后须知

1. 伤口会用无菌纱布遮盖，病人要保持伤口干爽与清洁。
2. 经主诊肾科医生或外科医生评估后，恢复服用阿士匹灵、其他抗血小板或薄血药物。
3. 病人若感到不适，请即通知医护人员。
4. 约 14 天后，如伤口愈合正常，便可拆线。
5. 保持伤口四周干爽，切勿搔痒导管出口及附近的皮肤，以免细菌感染，待植入的导管 4 至 6 星期后完全愈合，经护理人员指导后才可进行淋浴。
6. 术后病人或家属需要学习更换透析液的技巧，熟习后便可在家中自行进行腹膜透析治疗。
7. 在等候学习期间，病人可能需要接受间歇性腹膜或血液透析。
8. 病人需每日观察及妥善护理导管及导管口。

Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Episode No: _____



风险及并发症

1. 此手术可能会引起下列的并发症：
伤口渗漏(12%)；伤口感染(7%)；伤口流血(5%)；穿肠(0.5 - 3.5%)；有生命危险(罕见但有机会发生)。
2. 其他可能会引起的问题包括：伤口疼痛；穿破其他器官例如膀胱及血管；腹膜炎；内出血；导管移位、闭塞和在伤口处出现疝等等。
3. 如有并发症发生，在必要的情况下，病人可能需要接受其他检验及有需要之外科手术，其中包括拔除导管手术，当情况稳定，病人可能需要接受另一次「植入导管」手术。

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出现常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

1. 医管局「智友站」网页：腹膜透析导管植入术 (2017)
2. Hong Kong College of Physicians, Hong Kong Society of Nephrology, Hospital Authority. (2019). Care of Patient for Insertion of Peritoneal Catheter. *Clinical Practice Guidelines for the Provision of Renal Services in Hong Kong*, 24(1), 86.

病人签署：_____ 签署日期：_____

Patient's Label

Patient Name: _____
Hospital No: _____
Episode No: _____