



医疗程序须知

简介

瘻管是指一条连接两个空腔的管道，而肛门瘻管是指一条由肛门肠道通往肛门外侧之皮肤上的不正常管道。有关情况成因不详，但大部份患者曾有肛门脓疮之病史。患有肛门瘻管的人士可利用外科手术切除瘻管作治疗。

手术 / 程序过程

病人在全身麻醉下进行手术。医生会切开及刮除瘻管附近的炎症组织，伤口毋须缝合，但会以有消毒溶液之纱布敷在伤口内。病人需每日清洗伤口，直至伤口愈合为止。

手术 / 程序前须知

1. 病人经医生解释手术过程及风险，阅读手术须知，签署手术同意书。
2. 手术前或须接受身体检查，例如：血液、尿液、肺部X光检查或心电图等。
3. 接受麻醉科医生的术前评估及解释麻醉过程及风险，阅读麻醉须知，签署麻醉同意书。
4. 如有需要，护士会为病人去除肛门附近之体毛。
5. 手术前护士会为病人清洗肠道如直肠灌肠。
6. 于手术前洗头及洗澡。
7. 于手术前 6 - 8 小时禁止饮食，以减低手术时呕吐之危险。
8. 遵医嘱服用手术前驱药物。
9. 往手术室前应除去内衣裤及更换手术袍、穿手术袜及戴手术帽，然后除去假牙，隐形眼镜及饰物（包括发夹耳环及介指等）。
10. 往手术室前需排空膀胱。

手术 / 程序后须知

1. 病人因曾接受全身麻醉，或会感觉疲倦、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士协助。
2. 完全苏醒后即可恢复进食。
3. 伤口疼痛时，可通知护士，按医嘱注射或口服止痛药。
4. 伤口处理：一般情况下，毋须缝合伤口，但会填塞沾有消毒溶液之纱布，初时仍会渗出血水。按医嘱病人每天及大便后须坐浴及洗伤口。
5. 手术后可如常沐浴，但应保持肛门附近范围干爽。
6. 请依时服用医生处方之药物。
7. 均衡饮食及多补充水份，多进食高纤维食物如麦皮、香蕉、青菜等，以保持大便畅通。
8. 请依指示定期到医生诊所进行伤口护理及依指定日期及时间前往复诊。

Patient's Label

Patient Name: _____
Hospital No: _____
Episode No: _____



风险及并发症

1. 全身麻醉引起之并发症
 - 1.1 心血管系统并发症：心肌梗塞、心肌缺氧、中风、静脉栓塞、肺栓塞等。
 - 1.2 呼吸系统并发症：肺部膨胀不全、肺炎、哮喘发作、慢性阻塞性气管病发作。
 - 1.3 过敏及反应性休克。
2. 与手术有关之并发症
 - 2.1 1-2%病人会大便失禁。
 - 2.2 1-2%病人会出现肛门排气失控之情况。
3. 有机会复发。

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出现常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

Champagne, B. J., Weiser, M., & Chen, W. (2019) Operative management of anorectal fistular. UpToDate. Retrieved on 8/6/2020 from <https://www.uptodate.com/contents/operative-management-of-anorectal-fistulas>

Patient's Label
 Patient Name: _____
 Hospital No: _____
 Episode No: _____

病人签署：_____ 日期：_____