



醫療程序須知

簡介

肉毒桿菌 / 組織填充劑注射是創傷性而非手術性的美型輪廓程序，但效果非永久性的。

適應症

- 改善皺紋
- 瘦面
- 止汗
- 塑造豐盈的面部
- 改善小腿線條
- 半臉痙攣
- 臉痙攣

手術 / 程序前須知

1. 需簽署同意書。
2. 此療程需由醫生施行。
3. 可能需要使用局部麻醉。
4. 治療可能需要分多次進行，治療效果可因人而異。
5. 療程效果並無任何保證。
6. 治療前後之部位或需接受攝影，以作治療進度之參考。

手術 / 程序後須知

注射位置可能會有暫時性發紅或瘙癢，個別部位可能會有青紫現象。經冰敷便可減低不適，紅腫於數小時內可消退。

風險及併發症

1. 程序完成後，風險包括：
 - 1.1. 肉毒桿菌注射：皮膚紅癢、過度矯正、矯正不足、不對稱效果、眼皮下垂及眉弓下垂。
 - 1.2. 組織填充劑注射：皮膚紅癢、過度矯正、矯正不足、不對稱效果、皮膚結塊、過敏反應、細菌、病毒、真菌感染。
 - 1.3. 組織填充劑注射：皮膚壞死、失明、中風。
2. 因應不同人有不同皮膚狀況，施程序部位可能會有結疤或皮膚變質的風險。

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

Allergan Inc, MEDICATION GUIDE BOTOX® Cosmetic (Boe-tox) (onabotulinumtoxinA) for Injection (1/2016)

病人簽署：_____ 簽署日期：_____

Patient's Label Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____
--