

香港儿童免疫接种计划

项目	注意事项	出生	6周至2个月	4个月	6个月	9个月	12个月	18个月	24个月	本院提供	健康院提供
卡介苗		*								√	
乙型肝炎疫苗	如于出生后 6 周至 2 个月及 6 个月注射 6 合 1 混合疫苗，无需注射此疫苗	*	*		*					√	√
▲6 合 1 混合疫苗			*		*					√	
▲5 合 1 混合疫苗				*				*		√	
肺炎球菌疫苗			*	*			*			√	√
轮状病毒疫苗	第一次要在出生后 16 周前服用，第二次在 24 周前服用		*	*						√	
麻疹, 流行性腮腺炎, 德国麻疹及水痘混合疫苗							*	*		√	
乙型流感嗜血杆菌	如注射 6 合 1 或 5 合 1 混合疫苗，无需注射此疫苗		*	*	*			*		√	
甲型肝炎疫苗							*		*	√	
脑膜炎双球菌结合疫苗	2 岁后只需注射一针					*	*			√	
日本脑炎疫苗							*		*	√	
麻疹, 流行性腮腺炎及德国麻疹混合疫苗	如注射麻疹, 流行性腮腺炎, 德国麻疹水痘混合疫苗，无需注射此疫苗						*			√	√
水痘疫苗	如注射麻疹, 流行性腮腺炎, 德国麻疹水痘混合疫苗，无需注射此疫苗						*			√	√
▲4 合 1 混合疫苗	如注射 6 合 1 或 5 合 1 混合疫苗，无需注射此疫苗		*	*	*			*			√

▲6 合 1 混合疫苗 ---- 白喉、破伤风、无细胞型百日咳、乙型流感嗜血杆菌、灭活小儿麻痹及乙型肝炎

▲5 合 1 混合疫苗 ---- 白喉、破伤风、无细胞型百日咳、乙型流感嗜血杆菌及灭活小儿麻痹

▲4 合 1 混合疫苗 ---- 白喉、破伤风、无细胞型百日咳及灭活小儿麻痹



疫苗种类	可预防的传染病	传染病可引致的后果
卡介苗	肺结核	慢性传染病，可入侵身体多个器官
乙型肝炎疫苗	乙型肝炎	肝炎及肝癌
白喉, 破伤风, 百日咳疫苗	白喉	咽喉肿，发烧，呼吸困难及心脏受损
	破伤风	肌肉抽搐及痉挛，甚至死亡
	百日咳	长时间咳嗽，肺炎及脑部受损
小儿麻痹疫苗	小儿麻痹	损害神经系统及导致麻痹，严重者可引致死亡
乙型流感嗜血杆菌疫苗	乙型流感嗜血杆菌	脑膜炎，中耳炎，关节炎及肺炎等
肺炎链球菌接合疫苗	肺炎链球菌	细菌性肺炎，脑膜炎，菌血症，蜂窝组织炎（软组织感染），骨髓炎（骨骼感染），关节炎（关节感染）及急性中耳炎
麻疹，流行性腮腺炎，德国麻疹及水痘混合疫苗	麻疹	脑膜炎或脑炎等
	流行性腮腺炎	脑膜炎，胰腺炎；如青春期后感染病毒，有可能引致不育
	德国麻疹	若妊娠妇女受到感染，可能会对胎儿造成失明及先天性心脏病等严重损害
	水痘	全身出现红疹及水泡，而水泡结痂后可能会留下永久性疤痕；小脑炎
口服轮状病毒疫苗	轮状病毒	发烧，呕吐及腹泻，以致脱水而令主要器官衰竭的风险增加
脑膜炎双球菌疫苗	脑膜炎双球菌	脑膜炎败血病，甚至死亡；后遗症包括耳聋，神经疾病和截肢
日本腦炎疫苗	日本腦炎	没有特定药物去治疗。病者会头痛高烧，神志不清抽搐，康复者有可能有神经系统后遗症
甲型肝炎疫苗	甲型肝炎	严重肝病，肝衰竭甚至死亡

* 疫苗供应或会出现短缺情况，详情请向医护人员查询。