

香港兒童免疫接種計劃

項目	注意事項	出生	6 周至 2個月	4 個月	6 個月	9 個月	12 個月	18 個月	24 個月	本院 提供	健康 院提 供
卡介苗		*								√	
乙型肝炎疫苗	如於出生後 6 周至 2 個月及 6 個月注射 6 合 1 混合疫苗，無需注射此疫苗	*	*		*					√	√
▲6 合 1 混合疫苗			*		*					√	
▲5 合 1 混合疫苗				*				*		√	
肺炎球菌疫苗			*	*			*			√	√
輪狀病毒疫苗	第一次要在出生後 16 周前服用，第二次在 24 周前服用		*	*						√	
麻疹, 流行性腮腺炎, 德國麻疹及水痘混合疫苗							*	*		√	
乙型流感嗜血桿菌	如注射 6 合 1 或 5 合 1 混合疫苗，無需注射此疫苗		*	*	*			*		√	
甲型肝炎疫苗							*		*	√	
腦膜炎雙球菌結合疫苗	2 歲後只需注射一針					*	*			√	
日本腦炎疫苗							*		*	√	
麻疹, 流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗	如注射麻疹, 流行性腮腺炎, 德國麻疹水痘混合疫苗，無需注射此疫苗						*			√	√
水痘疫苗	如注射麻疹, 流行性腮腺炎, 德國麻疹水痘混合疫苗，無需注射此疫苗						*			√	√
▲4 合 1 混合疫苗	如注射 6 合 1 或 5 合 1 混合疫苗，無需注射此疫苗		*	*	*			*			√

▲6 合 1 混合疫苗 ---- 白喉、破傷風、無細胞型百日咳、乙型流感嗜血桿菌、滅活小兒麻痺及乙型肝炎

▲5 合 1 混合疫苗 ---- 白喉、破傷風、無細胞型百日咳、乙型流感嗜血桿菌及滅活小兒麻痺

▲4 合 1 混合疫苗 ---- 白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺



疫苗種類	可預防的傳染病	傳染病可引致的後果
卡介苗	肺結核	慢性傳染病，可入侵身體多個器官
乙型肝炎疫苗	乙型肝炎	肝炎及肝癌
白喉, 破傷風, 百日咳疫苗	白喉	咽喉腫，發燒，呼吸困難及心臟受損
	破傷風	肌肉抽搐及痙攣，甚至死亡
	百日咳	長時間咳嗽，肺炎及腦部受損
小兒麻痹疫苗	小兒麻痹	損害神經系統及導致麻痹，嚴重者可引致死亡
乙型流感嗜血桿菌疫苗	乙型流感嗜血桿菌	腦膜炎，中耳炎，關節炎及肺炎等
肺炎鏈球菌接合疫苗	肺炎鏈球菌	細菌性肺炎，腦膜炎，菌血症，蜂窩組織炎（軟組織感染），骨髓炎（骨骼感染），關節炎（關節感染）及急性中耳炎
麻疹，流行性腮腺炎，德國麻疹及水痘混合疫苗	麻疹	腦膜炎或腦炎等
	流行性腮腺炎	腦膜炎，胰臟炎；如青春期中後感染病毒，有可能引致不育
	德國麻疹	若妊娠婦女受到感染，可能會對胎兒造成失明及先天性心臟病等嚴重損害
	水痘	全身出現紅疹及水泡，而水泡結痂後可能會留下永久性疤痕；小腦炎
口服輪狀病毒疫苗	輪狀病毒	發燒，嘔吐及腹瀉，以致脫水而令主要器官衰竭的風險增加
腦膜炎雙球菌疫苗	腦膜炎雙球菌	腦膜炎敗血病，甚至死亡；後遺症包括耳聾，神經疾病和截肢
日本腦炎疫苗	日本腦炎	沒有特定藥物去治療。病者會頭痛高燒，神志不清抽搐，康復者有可能有神經系統後遺症
甲型肝炎疫苗	甲型肝炎	嚴重肝病，肝衰竭甚至死亡

* 疫苗供應或會出現短缺情況，詳情請向醫護人員查詢。