



## 醫療程序須知

### 簡介

眼底血管造影術是一個安全、有效的檢查眼底視網膜及脈絡膜方法。透過利用螢光劑及靛青綠拍攝，可以觀察到眼底血液循環的過程，使醫生能夠更準確地診斷病情及計劃合適的治療方案。

### 適應症

適用於檢查視網膜及脈絡膜病變，包括有炎症、水腫、血管異常、瘤腫或一些系統性疾病如糖尿及血壓高等。

### 手術 / 程序過程

1. 首先滴擴瞳眼藥水把瞳孔放大。
2. 將螢光劑及靛青綠注射入前臂的血管。
3. 注射時可能感到短暫作悶作嘔，但無大礙。
4. 用特別的照相機拍攝眼底照片或影片。
5. 檢查需時間約三十至四十分鐘。

### 手術 / 程序前須知

螢光劑及靛青綠可能影響胎兒，因此孕婦應避免接受此檢驗。

### 手術 / 程序後須知

1. 因擴瞳關係，當日的視力會模糊，特別是看近的事物，所以檢查當日不宜駕駛。
2. 配戴太陽眼鏡可以減低擴瞳後的畏光現象。
3. 螢光劑會導致當日的小便、皮膚、眼白呈現黃色。請多喝開水，使螢光劑經由小便排出體外。

### 風險及併發症

1. 少於百份之五的病人會出現敏感性皮疹，通常為持數小時至數天並易於治療，亦有極少數之病人於注射範圍之皮膚出現發炎或皮膚潰爛之現象。
2. 約萬分之一的病人對螢光劑或靛青綠有嚴重過敏反應，導致呼吸困難、休克、甚至有生命危險。凡對藥物或食物有過敏或心臟病患者，檢查前應先通知醫護人員。
3. 腎功能減退的病人須要減低螢光劑的份量。

### 免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

### 參考資料

American Academy of Ophthalmology, EyeWiki, Article: Fluorescein Angiography (10/2020) from [http://eyewiki.org/Fluorescein\\_Angiography](http://eyewiki.org/Fluorescein_Angiography)

病人簽署：\_\_\_\_\_ 簽署日期：\_\_\_\_\_

#### Patient's Label

Patient Name: \_\_\_\_\_

Hospital No: \_\_\_\_\_

Episode No: \_\_\_\_\_