



## 醫療程序須知

### 簡介

血管內皮細胞生長因子抗體可治療視網膜新增血管及黃斑水腫，須直接注射眼睛玻璃體。因應病因及病人對藥物反應不同，須接受注射次數亦有別。

### 適應症

- 老年黃斑退化 (ARMD)。
- 近視黃斑退化。
- 視網膜靜脈栓塞糖尿眼引致黃斑水腫。
- 息肉狀脈絡膜血管病變 (PCV)。

### 手術 / 程序過程

1. 注射前先滴麻醉眼藥水及為眼睛消毒。
2. 透過鞏膜 (即「眼白」) 注射藥物。

### 手術 / 程序前須知

雖然有局部麻醉藥，部份病人手術時仍會感到痛楚，嚴重程度因個別病人敏感度而異。

### 手術 / 程序後須知

須遵循醫生指示滴眼藥水及覆診。

### 風險及併發症

併發症並不常見，但下列情況可於手術時或手術後發生：

1. 眼壓升高或下降。
2. 白內障。
3. 飛蚊。
4. 結膜出血、眼球內出血。
5. 眼球內發炎、感染或化膿。
6. 視網膜穿洞或脫離。
7. 未能治癒視中心點病變或已有之眼病黃斑點水腫持續。
8. 視力減退、失明。
9. 可能增加心血管或腦血管病的風險如心臟病或中風。

### 免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

### 參考資料

American Academy of Ophthalmology, EyeWiki, Article: Intravitreal Injections (7/2021) from [http://eyewiki.org/Intravitreal\\_Injections](http://eyewiki.org/Intravitreal_Injections)

病人簽署：\_\_\_\_\_ 簽署日期：\_\_\_\_\_

#### Patient's Label

Patient Name: \_\_\_\_\_

Hospital No: \_\_\_\_\_

Episode No: \_\_\_\_\_