



## 医疗程序须知

### 简介

血管内皮细胞生长因子抗体可治疗视网膜新增血管及黄斑水肿，须直接注射眼睛玻璃体。因应病因及病人对药物反应不同，须接受注射次数亦有别。

### 适应症

- 老年黄斑退化 (ARMD)。
- 近视黄斑退化。
- 视网膜静脉栓塞糖尿眼引致黄斑水肿。
- 息肉状脉络膜血管病变 (PCV)。

### 手术 / 程序过程

1. 注射前先滴麻醉眼药水及为眼睛消毒。
2. 透过巩膜 (即「眼白」) 注射药物。

### 手术 / 程序前须知

虽然有局部麻醉药，部份病人手术时仍会感到痛楚，严重程度因个别病人敏感度而异。

### 手术 / 程序后须知

须遵循医生指示滴眼药水及覆诊。

### 风险及并发症

并发症并不常见，但下列情况可于手术时或手术后发生：

1. 眼压升高或下降。
2. 白内障。
3. 飞蚊。
4. 结膜出血、眼球内出血。
5. 眼球内发炎、感染或化脓。
6. 视网膜穿洞或脱离。
7. 未能治愈视中心点病变或已有之眼病黄斑点水肿持续。
8. 视力减退、失明。
9. 可能增加心血管或脑血管病的风险如心脏病或中风。

### 免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出现见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

### 参考资料

American Academy of Ophthalmology, EyeWiki, Article: Intravitreal Injections (7/2021) from [http://eyewiki.org/Intravitreal\\_Injections](http://eyewiki.org/Intravitreal_Injections)

病人签署：\_\_\_\_\_ 签署日期：\_\_\_\_\_

<b>Patient's Label</b>
Patient Name: _____
Hospital No: _____
Episode No: _____