

簡介

病人如需要接受動脈或靜脈注射造影劑檢查，醫生會注射造影劑入動脈或靜脈，然後用 X 光檢查。加入造影劑的檢查會比較清晰，醫生從而比較清楚看到病人異常的情況。一般來說，造影劑是一種安全的藥物，但間中亦會引起副作用。醫生相信這項檢查是必須的，因為它所提供的資料有助加深了解病情及診治。

風險及併發症

一般而言，顯影劑是很安全的，但偶有併發症出現。

一般風險:

- **輕微反應**：包括痕癢、作嘔、熱暖感覺、手痛、打噴嚏、咳嗽及少許呼吸困難。部份病人會較遲有反應通常會 24 小時內感到注射造影劑的靜脈注射位痛楚、痕癢、紅疹或唾液腺有腫脹。此等症狀維持短暫，不需或只需少許治療。
- **中度反應**：反應症狀比較嚴重及維持比較長時間。病人會有紅疹，發燒，寒顫，血壓上升或下降，心悸。只是需要特別治療及觀察。
- **嚴重反應**：反應包括氣促，心律不齊，心絞痛，急性腎衰竭，抽搐及昏迷。如有此等反應，必須立即治療。

特別風險：

當注射顯影劑時有機會發生顯影劑外滲。病人會感到靜脈注射為不適或痛楚。
若出現嘔吐現象，胃內之口服造影劑有可能被吸入肺部。
死亡病人對造影劑敏感而導致死亡非常罕見。

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫管局「智友站」網頁：顯影造影劑的電腦掃描檢查接(v2/2020)