香港浸信會醫院
Hong Kong Baptist Hospital

腹膜腔穿刺放液術(需要時施行引流術)
Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping (and Drainage if necessary)

腹膜腔穿刺放液術(需要時施行引流術) Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping (and Draining if necessary)

醫療程序須知

簡介

腹腔穿刺術是一項簡單的程序，用於移除腹腔積液(腹水)。在正常情況腹腔裡只會有少量的液體存在。當液體在腹腔中累積 (即腹水)，可進行腹腔穿刺術引出腹水。

適應症

- 診斷用途 ：抽取之腹水可作化驗，確定成因。
- 治療用途 ：引出聚積過多的腹水以舒緩相關的腹脹、脹氣、腹痛和呼吸困難。

手術 / 程序過程

1. 病人需平躺或側臥於床上以便配合抽取腹水或引流。
2. 醫生會先在施針的位置進行皮膚消毒。
3. 然後醫生會在下針的位置施加局部麻醉藥。
4. 待藥力生效後，隨即將刺針/引流管經皮膚插進入腹腔，並用針筒抽取腹水。
5. 醫生會抽出適量的腹水，以達到檢查或治療的目的。

手術 / 程序前須知

1. 病人需簽署手術同意書。
2. 於程序前小便。

手術 / 程序後須知

1. 檢查完成後，病人需遵醫囑在床上休息。
2. 醫護人員將緊密監察病人之血壓、脈搏，以觀察併發症有否出現。

風險及併發症

一般來說，這是一個風險相對較低的檢查。罕見但嚴重的併發症，包括腹水滲漏(5%)、嚴重內出血(0-0.97%)、感染(0.58-0.63%)、腹腔穿刺術相關的死亡 (0-0.39%)。

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

Runyon, B. A., Chopra, S. & Robson, K. M. (2021). Diagnostic and therapeutic abdominal paracentesis. *UpToDate.* Retrieved from https://www.uptodate.com/contents/diagnostic-and-therapeutic-abdominal-paracentesis?source=history_widget#H337673812

Patient's Label
Patient Name: _____
Hospital No:_____
Episode No:_____

病人簽署：_____ 簽署日期：_____