醫療程序須知

簡介

人工晶體用以置於眼球內，代替被摘除的白內障，以用作改善視力。當晶體異位或鬆脫時便需要固定人工晶體以求達致較佳屈光效果及改善視力。

適應症

1. 白內障或晶體異位，鬆脫
2. 無晶體狀況
3. 白內障術內出現併發症
4. 眼部創傷

手術 / 程序過程

1. 醫生會視乎你的身體狀況及手術情況而建議你接受全身或局部麻醉。
2. 手術時醫生會在你眼睛的角膜邊緣開一個小切口，整體地摘除或以超聲波乳化吸走混濁的晶體，繼而植入並固定人造晶體於鞏膜上。有需要時會以縫線縫合傷口。

手術 / 程序前須知

1. 為你量度眼睛長度及角膜弧度，以決定人造晶體的型號及度數。
2. 保持眼皮清潔以減低手術後發炎機會。
3. 手術前依處方服用藥物或滴眼藥水。
4. 手術當天不宜化妝。
5. 如你有內科病如高血壓、中風、心臟病、糖尿病、排尿障礙等，或長期需要服西藥（如薄血丸，抗凝血劑）、中藥或健康食品等，請預早通知醫生。

手術 / 程序後須知

1 避免揉眼。
2 手術後數星期不宜游泳或做劇烈運動。
3 在手術後首週避免污水接觸眼睛。
4 手術後數星期，宜穿著扣鈕衣服及避免穿過頭衣服，以避免衣服觸及眼睛而引致發炎。
5 你必須按照醫生的指示用藥，並於預定的日期覆診。
6 康復期或需數月時間，其間可能要拆線。
7 術後屈光矯正以達最佳視力，包括閱讀能力(如戴眼鏡或隱形眼鏡等)
8 如病人之視網膜，視神經或角膜在手術前有病變，或有青光眼，虹膜炎等，術後視力可能未臻完美。
9 如因併發症出現，術後視力有可能比術前差。

Patient's Label
Patient Name: _____
Hospital No:_____
Episode No:_____

10 如手術後有以下徵狀，則應盡快聯絡你的醫生、眼科中心或門診部求診：
- 10.1 眼睛大量出血
- 10.2 劇烈痛楚
- 10.3 發燒
- 10.4 眼睛出現發炎徵象，例如：傷口紅腫發炎、或傷口分泌物有惡臭等。

風險及併發症

手術是十分安全的，併發症並不常見，但亦存在一定的風險。除因麻醉可能引起的併發症外，以下情況或會出現：

- 眼內嚴重出血
- 眼內白內障殘餘物留存，有可能需要進一步手術清除
- 人工晶體不能內置
- 人工晶體移位，傾斜，破損或鬆脫
- 傷口破裂
- 瞳孔變型
- 線口之併發症，例如發炎，鬆脫等
- 角膜腫脹或霧化
- 眼壓過高或過低
- 眼瞼下垂
- 視網膜或脈絡膜脫落
- 黃斑點水腫
- 眩光或視覺變型
- 或需多次手術
- 眼內發炎或化膿
- 交感性神經眼內炎
- 失明

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

American Academy of Ophthalmology, EyeWiki, Article: Scleral Fixated Intraocular lens (11/2022) from https://eyewiki.org/Scleral_Fixated_Intraocular_Lens

香港眼科醫院(2021 年 4 月) 病人須知 -鞏膜固定人工晶體植入手術

Patient's Label
Patient Name: _____
Hospital No:_____
Episode No:_____

病人簽署：_____ 簽署日期：_____