

Cryotherapy/Indirect laser therapy

醫療程序須知

簡介

冷凍療法包括通過將非常冷的探頭應用於眼睛外部(鞏膜),將冰凍溫度傳輸到視網膜,而施加 在視網膜上的強烈寒冷能密封視網膜撕裂和滲漏的視網膜血管。間接激光是指用儀器把激光 施加在視網膜上,從而達到治療效果。

適應症

● 視網膜撕裂或退化

手術 / 程序過程

- 1. 一般情况下可局部麻醉下施行。
- 2. 手術前病人需要接受擴大瞳孔、局部麻醉等眼藥水。
- 3. 醫生將使用由一氧化二氮冷卻的專用探頭對著您的眼睛。冰晶和水晶會滲入您的眼睛, 迅速解凍並破壞受損的視網膜細胞。疤痕組織立即開始形成,並在大約兩週內癒合。如 果您有視網膜脫離,可能需要多次冷凍治療才能將視網膜重新連接到視神經組織。

手術 / 程序前須知

- 1. 保持眼皮清潔以減低手術後發炎機會。
- 2. 手術前依處方服用藥物或滴眼藥水。
- 3. 手術當天不宜化妝。
- 4. 如你有內科病如高血壓、中風、心臟病、糖尿病、排尿障礙等,或長期需要服西藥(如 蓮血丸,抗凝血劑)、中藥或健康食品等,請預早通知醫生。

手術 / 程序後須知

- 1. 避免揉眼。
- 2. 手術後數星期不官游泳或做劇烈運動。
- 3. 在手術後首週避免污水接觸眼睛。
- 4. 手術後數星期,官穿著扣鈕衣服及避免穿過頭衣服,以避免衣服觸及眼睛而引致發炎。
- 5. 你必須按照醫生的指示用藥,並於預定的日期覆診。
- 6. 手術後初期可能需要俯臥或盡量使面向下及不能乘搭飛機
- 7. 如手術後有以下徵狀,則應盡快聯絡你的醫生、眼科中心或門診部求診:
 - 眼睛大量出血
 - 劇烈痛楚
 - 發燒
 - 眼睛出現發炎徵象,例如:傷口紅腫發炎、或傷口分泌物有惡臭等。

Patient's Label	
Patient Name:	
Hospital No:	
Episode No:	





冷凍療法/間接激光

Cryotherapy/Indirect laser therapy

風險及併發症

一般風險/併發症如下:

- 1. 咸染、出血、發炎、眼部不適或疼痛
- 2. 傷口癒合不良或相關併發症、結疤
- 3. 眼臉及結膜腫脹
- 4. 流眼水
- 5. 需重複接受手術或接受進一步手術/程序
- 6. 眼疾復發

重要風險/併發症如下:

- 1. 視網膜脫落、視網膜未能黏合
- 2. 眼壓過高或過低、視野缺損
- 3. 晶體受損、白內障惡化、人工晶體脫位或鬆脫
- 4. 黄斑點水腫及纖維化、視網膜血管閉塞、角膜水腫及細胞損傷、鞏膜刺穿
- 5. 眼瞼下垂
- 6. 對局部麻醉藥過敏、眼球後出血

罕見的嚴重併發症如下:

- 1. 眼內炎
- 2. 脈絡膜上腔出血
- 3. 失明、永久性喪失視力
- 4. 眼球萎縮、交感性眼炎

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料,並列出常見的風險或併發症;可能發生的風險或 併發症不能盡錄,亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢,請聯絡你的醫生。

參考資料

醫院管理局2019 年1 月 接受手術/醫療程序/治療同意書: Cyro / Indirect Laser。

		Γ	
		Patient's Label	
		Patient Name:	
		Hospital No:	
		Episode No:	
病人簽署:	簽署日期:		·